

經

驗

方



傷寒

心悸脉結代者 甘草二兩水三升煮一半服七合日一服傷寒

要類

咽痛少陰證 甘草二兩蜜水炙水二升煮一升半服五合日

二服

張仲景
傷寒論

壞症凡傷寒時疫不問陰陽老幼妊婦誤服藥餌困重垂死脉

沈伏不省人事七日以後皆可服之百不失一 人蔘一兩

水二鍾緊火煎一鍾以井水浸冷服之少頃鼻梁有汗出脉

厥逆身有微熱煩躁六脉沈細微弱此陰極發躁也 人蔘半

兩水一鍾煎七分調牛膽南星末二錢熱服立甦三因

夾陰先因慾事後感寒邪陽衰陰盛六脉沈伏小腹絞痛四肢

逆冷嘔吐清水不假此藥無以回陽 人蔘乾薑炮各一兩

生附子一枚破作八片水四升半煎一升頓服脉出身溫卽

愈

吳綬傷寒蘊要

腹脹陰陽不和也

桔梗半夏陳皮各三錢姜五片水二鍾煎

一鍾服

南陽活人書

少陰證二三日咽痛者

桔梗一兩甘草二兩水三升煮一升

分服

張仲景傷寒論

下痢不能食者

黃連一升烏梅二十箇去核炙燥爲末蠟一

碁子大蜜一升合煎和丸梧子大一服二十九日三服一

方黃連二兩熟艾如鴨子大一團水三升煮取一升頓服立

止

並肘後方

勞復身熱大小便赤如血色

胡黃連一兩山梔子二兩去殼

入蜜半兩拌和炒令微焦爲末用猪膽汁和丸梧子大每服

十九用生姜二片烏梅一箇童子小便三合浸半日去滓食

後暖小便令溫吞之卧時再服其効蘇頌圖經本州

煩渴心神躁熱 秦芩一兩牛乳一大盞煎六分分作二服平太

聖惠方

傷寒之後邪入經絡體瘦肌熱推陳致新解利傷寒時氣伏暑

倉卒並治不論長幼 柴胡四兩甘草一兩每三炙水一盞

煎服許學士本事方

天行病四五日結胸滿痛壯熱 苦蔞一兩以醋三升煮取一

升二合飲之取吐即愈天行毒病非苦蔞醋藥不解及溫覆取汗良外臺秘要

因熱甚飲水成暴冷嘔者 茅根切枇杷葉拭去毛炙香各半

斤水四升煎二升去滓稍飲之龐安常傷寒卒病論

伏熱在胃令人胸滿則氣逆則嘔或大下胃中虛冷亦致嘔

也茅根切葛根切各半斤水三升煎一升半每注飲一觥噦

止即傳

同上

傷寒發狂草龍膽為末入鷄子清白蜜化涼水服二錢

傷寒

一切傷寒不問陰陽輕重老少男女孕婦皆可服之白芷一

兩生甘草半兩薑三片葱白三寸棗一枚豉五十粒水二碗

煎服取汗不汗再服病至十一日未得汗者皆可服之

衛生家寶方

下痢蔥草湯用蔥草當歸各二兩黃連四兩水六升煮二升

服日三服

范汪方

狐惑食肛者蔥草黃連各四兩呋咀以白酸漿一斗漬一宿

煮取二升分三服

小品方

四時傷寒不正之氣香薷為末熟酒調服一二錢取汗

衛生家寶方

氣喘不止赤蘇一把水三升煮一升稍飲之

衛生家寶方

傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脉盛 乾艾葉三升水一斗煮一升

頓服取汗

肘后方

妊娠傷寒壯熱赤斑變為黑斑溺血 艾葉如鷄子大酒三升

煮二升半分為二服

傷寒類安

時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能飲食 牛蒡根搗汁

服一小盞效

聖惠方

天行時氣 生牛蒡根搗汁五合空腹分為二服 訖取桑葉

一把炙黃以水一升煮取五合頓服取汁無葉用枝食真人

勞復食復欲死並以 蘆根煮濃汁飲

肘后方

天行熱狂以芭蕉根搗飲汁之

日華子本草

傷寒時氣初得頭痛壯熱脉盛者 生蘆荷根葉合搗絞汁服

三四升

肘后

天行熱病初起一二日者、麻黃一兩去節水四升煮去沫取

二升去滓著米一匙及豉為稀粥先以湯浴後乃食粥厚覆

取汗即愈

孟詵必用方

黃疸表熱 麻黃一把去節綿裹美酒五升煮取半升頓服取

小汗春月用水煮

千金方

勞復 葵子二升粳米一升煮粥食取汗立安

聖惠

傷寒初愈交合陰陽必病拘急手足拳小腹急熱頭不能舉名

陰陽易當汗之滿四日難治 藍藍一把雄鼠屎三七枚水煎

服取汗

聖惠方

時行熱毒心神煩躁

藍澱

乃藍與石灰作成

一匙新汲水一盞服

聖

赤斑

青黛二錢水研服

活人書

勞復因交後卵腫或縮入腹痛

蓼子一把水按汁飲一升後

時疫流毒攻手足腫痛欲斷虎杖根剉煮汁漬之時後方

痞滿病發於陰而反下之心下滿而不痛按之濡此為痞也

大黃二兩黃連一兩以麻沸湯二升漬之須臾絞汁分作二

次溫服仲景傷寒論

譫狂川大黃五兩剉炒微赤為散用臘雪水五升煎如膏每

服半匙冷水下雅惠方

發黃上方同氣壯者大黃一兩水二升漬一宿平旦煎汁一升

八芒硝一兩緩服須臾當利下傷寒類要

少陰初得二三日脉微細但欲寐小使色白者微發其汗麻黃

去節二兩甘草炙二兩附子炮去皮一枚水七升先煮麻黃

去沫納二味煮取三升分作三服取微汗張仲景傷寒論

少陰病始得反發熱脉沉者發其汗麻黃去節二兩附子炮去

皮一枚細辛二兩水一斗先煮麻黃去沫乃納二味同煮三

升分三服

同上

傷寒已發汗不解反惡寒者虛也 芍藥三兩甘草炙三兩附

子炮去皮一枚水五升煮取一升五合分服

同上

傷寒下後又發其汗晝日煩躁不得眠夜不安靜不嘔不渴無

表證脉沉微身無大熱者 乾薑一兩生附子一枚去皮破

作八片水三升煮取一升頓服

傷寒論

傷寒陰盛格陽其人必躁熱而不飲水脉沉手足厥逆者 大

附子一枚燒存性為末蜜水調服逼散寒氣然後熱氣上行

汗出乃愈

孫兆口訣

熱病吐下及下利身冷脉微發躁不止者附子炮一枚去皮臍

分作八片入鹽一錢水一升煎半升溫服立効

經驗良方

陰毒傷寒房後受寒少腹疼痛頭疼腰重手足厥逆脉息沉細

或作呃逆

川烏頭乾薑等分切炒放冷為散每服一錢水

一盞鹽一撮煎取半盞溫服得汗解

孫兆口訣

陰毒心腹痛厥逆惡候

川烏頭去皮臍冷水浸七日切晒乾

畏收之遇有患者取為末一錢入鹽八分水一盞煎八分服

歷下陰毒如猪血相似再進一服

陰毒傷寒面青四肢厥逆腹痛身冷一切冷氣大附子三枚

炮裂去皮臍為末每服三錢薑汁半盞冷酒半盞調服良久

臍下如火煖為度

陰毒傷寒煩燥迷悶惡者

半兩重附子一箇生破作四片生

薑一大塊作三片米一撮以水一升煎六合溫服煖卧令汗

出或不出候心定則以水解散之類解之不得與冷水如渴

夏煎浮服屢用多效

陰毒傷寒 生草烏頭為末以葱頭蘸藥納穀道中

急傷寒病 半夏四錢生薑七片酒一盞煎服 胡洽居士百病方

乾哕 半夏熟洗研末生薑湯服一錢七 梅師方

少陰咽生瘡不能言聲不出者 半夏七枚打碎鷄子頭開一

竅去黃納苦酒令小滿入半夏在內以銀子坐于炭火上煎

三沸去滓置盃中時時嚥之極驗未瘡更作 仲景傷寒論

咽閉腫痛 生射干猪脂各四兩合煎令焦去滓每噲棗許取

瘡 龐安常傷寒論

下齰生瘡以蛇莓汁服二合日三服仍水漬烏梅令濃入崖蜜

飲之 肘后方

結胸心腹硬痛 牽牛頭末一錢白糖化湯調下 鄭氏家傳方

時疾發黃在悶煩熱不識人者大瓜萋實黃者一枚以新汲水

九合浸淘取汁入蜜半合朴消八分盡分再服便瘥蘇頌面經

煩渴思飲 栝樓根三兩水五升煮一升分二服先以淡竹瀝

黃好銀二兩半冷水飲汁然後服此外臺秘傳

百合病渴 栝樓根牡蠣熬等分散為飲服方寸匕永類方

數種傷寒病人不能分別今取一藥兼治天行時氣初覺頭痛

內熱脉洪者 葛根四兩水二升八鼓一升煮取半升服生

薑汁七升傷寒類要

時氣頭痛壯熱 生葛根洗淨搗汁一大盞豉一合煎六分去

滓分服汗出師瘥未汗再服苦心熱加梔子仁十枚聖惠方

頭痛二三日發熱者 葛根五兩香豉一升以童子小便八升

煎取二升分三服食葱粥取汗梅師方

妊娠熱病 葛根汁二升分三服傷寒類要

預防熱病急黃賊風 葛粉二升生地黄一升香豉半升為散

每食後米飲服方寸七日三服有病五服龐安常論

天行熱病 白藥子為末漿水一盞冷調二錢服仰臥少煩心

悶或腹鳴痞痛當吐利數行如不止喫冷粥一盞止之聖濟錄

喘急 防己人蔘等分為末桑白湯服二錢不拘老幼

夾驚 紫背浮萍一錢屏角屑半錢釣藤鉤三七箇為末每服

半錢蜜水調下連進三服出汗為度聖濟錄

發黃 生烏麻油一盞水半盞鷄子白一枚和攪服盡外臺

熱病餘毒攻手足疼痛欲脫 稻穰灰煮汁漬之肘后方

陰毒傷寒危篤者 黑豆炒乾投酒熱飲或灌之吐則復飲汗

出為度居家必用

狐惑病脉数无热微煩默然但欲卧汗出初得三四日目赤如

鳩七八日目四眦黃黑若能食者膿已成也赤小豆三升

水浸令芽出當歸三兩為末漿水服方寸匕日三服全隨要

傷寒有數種庸人卒不能分別者今取一藥兼療之凡初覺頭

痛身熱脉洪一二日葱白七虎口豉一升綿裹水三升煮

一升頻服取汗更作加葛根三兩再汗加麻黃三兩葛根洪

方又用葱湯煮米粥入豉食之取汗男溺三升煮一升分服取汗同上又用豉一升小

傷寒不止不解已三四日胸中悶惡者豉一升鹽二合水四

升煮一升半分服取吐此秘法也梅師方

辟除溫疫豉和白木浸酒常服之梅師

懊懺吐下後心中懊懺天下後身熱不去心中痛者肥瘧子

十四枚水二盞煮一盞分豉半兩同煮至七分去滓服得吐

止后服 傷寒論

傷寒後毒氣攻手足及身體虛腫豉五合微炒以酒一升半同

煎五七沸任性飲之 簡要濟衆

目翳燒 豉二七枚研末吹之

暴痢 豉一升薤白一握水三升煮薤熟納豉更煮色黑去豉

分為二服 藥性論

食復 麴一餅煮汁飲之良 類要方

天行餘毒手足腫痛欲斷作坑深三尺燒熱灌酒著履居坑上

以衣壅之勿令泄氣 類要方

陰陽易病男子陰腫小腹絞痛頭重眼花 破鼠屎十四枚韭

根一大把水二瓊煮七分去滓再煎二沸溫服得汗愈未汗

再服 南陽活人書 勞復方同上

感冒風寒初起 葱白一握淡豆豉半合泡湯服之取汗賴湖集簡方

頭痛如破者 連鬚葱白半斤生薑二兩水煮溫服活人書

時疾頭痛發熱者 連根葱白二十根和米煮粥入醋小許熱

食取汗即解濟生秘覽○數種傷寒初起一二日不能分別

者用上法取汗

勞復因交接者腹痛卵腫 葱白搗爛苦酒一盞和服之千金

時氣溫病初得頭痛壯熱脉大 小蒜一升并汁三合頓服不

過再作便瘥肘后方

感寒無汗 水調芥子末填臍內以熱物隔衣熨之取汗出妙

楊起簡便方

陰證腹痛厥逆 芥子研末水調貼臍上生編

預穰時疾立春後遇庚子日 溫蔓菁汁令家大小並服之不

限多少一年可免時疾 神仙教子法

傷寒後婦人雖差未滿百日不可與男合為病拘急手足拳腹
痛欲死丈夫名陰易婦人名陽易速汗之即愈滿四日不可
治也 乾薑四兩為末每用半兩白湯調服覆衣被出汗後
手足伸即愈 傷寒類要方

脫陽小使不通 茴香末以生薑自然汁調傳腹上外用茴香
末八益元散服之 摘玄方

襍解毒氣六月六日 采馬齒莧晒乾元旦煮熟同鹽醋食之
可解毒氣 唐寶經驗方

百合病行住坐臥不定如有鬼神狀已發汗者 百合七枚以
泉水浸一宿明朝更以泉水煮取一升却以知母三兩用泉
水二升煮一升同百合再煮取一升半分服 仲景金匱要畧

百合病已經吐後者 百合七枚泉水浸一宿明旦更以泉水

二升煮取一升八雞子黃一個分再服

上同

百合病已經下後者 百合七枚泉水浸一宿明旦更以泉水

二升煮取一升却以代赭石一兩滑石三兩水二升煮取一

升同百合汗再煮取一升半分再服

上同

百合病未經汗吐下者 百合七枚泉水浸一宿明朝更以泉

水二升煮取一升八生地黄汁一升同煎取一升半分再服

上同

百合病已經月變成消渴者 百合一升水一升漬一宿取汁

溫浴病人浴畢食白湯餅

陳延之小品方

百合變熱者 百合一兩滑石三兩為末飲服方寸匕微利乃

良

小品方

卷之六

百合病

方

卷之六

百合病

方

百合腹滿作痛者 百合炒為末每飲服方寸匕日二小品方

陰毒傷寒 百合煮濃汁服一升良孫真人食忌

溫病食勞 杏仁五兩酢二升煎取一升服之取汗差類要

頭痛壯熱胸中煩痛四五日不解 烏梅十四枚鹽五合水一

升煎半升溫服取吐後避風良梅師方

蠱瘡生下部者 烏梅肉三兩炒為末煉蜜凡梧子大以石榴

根皮煎湯食前下三十九聖惠方

小兒時氣 桃葉三兩水五升煮十沸取汗日五六遍淋之後

燒雄鼠糞二枚服之妙傷寒類要○熱病口瘡或匿桃枝煎濃汁

天行疫癘 常以東行桃枝煎熬湯浴之佳類要
含之下部有瘡

熱病後口乾咽痛喜唾大棗二十枚烏梅十枚搗入蜜丸含一

杏仁噉汁甚效千金方

互熨足心候氣透痛亦即止累有效

聖惠方

熱病發黃瓜蒂為末以大豆許吹臍中輕半日重則一日流取

黃水乃愈

千金翼

時氣煩渴生藕汁一盞生蜜一合和勻細服

聖惠

口乾生藕汁生地黄汁童子小便各半盞煎溫服之

龐安時傷寒論

產後血運欲死荷葉紅花薑黃等分炒研末童子小便調服

二錢

龐安時傷寒論

孕婦傷寒大熱煩渴恐傷胎氣嫩卷荷葉焙半兩蚌粉二錢

半為末每服三錢新汲水入蜜調服并塗腹上名單胎散

方

時氣瘴疫社中西南柏樹東南枝取暴乾研末每服一錢新水

調下日三四服

聖惠方

天行溫疫十松葉細切酒服方寸七日三服能辟五年瘟傷寒類要

呃逆及噦逆不定丁香一兩乾柿蒂焙一兩為末每服一錢

煎人參湯下簡要濟衆方

陰證呃逆乳香同硫黃燒烟嗅之傷寒類要

傷寒舌出過寸者梅花片腦半分為末摻之隨手即愈洪蘧

志

遺毒手足腫痛欲斷黃蘗五斤水三升煮漬之肘后方

時氣溫病頭痛壯熱初得一日生梓木削去黑皮取裏白者

切一升水二升五合煎汁每服八合取瘥肘后方

發狂六七日熱極狂言見鬼欲走取桐皮削去黑擘斷四寸

一束以酒五合水一升煮半升去滓頓服當吐下青黃汁數

升即瘥肘后方

小兒傷寒五日已後熱不退棗葉半握麻黃半兩葱白豆豉各

一合童子小便二鍾煎一鍾分二服取汗總錄

傷寒溫疫已發未發 梨木皮大甘草各一兩黃林藪一合為

末鍋底煤一錢每服三錢白湯下日二服取愈黎居士簡易

呃逆聲聞四隣 四花青皮全者研末每服二錢白湯下醫林

男女傷寒嘔噦手足冷逆者 橘皮四兩生薑一兩水二升煎

一升徐徐呷之即止仲景方

溫病發噦因飲水者 枇杷葉去毛炙香茅根各半斤水四升

煎二升稍飲之龐安常方

風寒無汗發熱頭痛 核桃肉葱白細茶生薑等分搗爛水一

鍾煎七分熱服覆衣取汗談楚翁方

陰病下早成痞按之虛軟而不痛檳榔枳實等分為末每服二

錢黃連煎湯下宣明方

結胸已經汗下後者 檳榔二兩酒二盞煎一盞分二服時傷

論寒

傷寒嘔血繼而齒縫出不止 開口川椒四十九粒入醋一盞

同煎熟入白礬少許服之直指方

發散寒邪 胡椒丁香各七粒碾碎以葱白搗膏和塗兩手心

合掌握定夾於大腿內側溫服取汗則愈傷寒廿經要

欬逆日夜不止寒氣攻胃也 胡椒三十粒打碎麝香半錢酒一

鍾煎半鍾熱服聖惠方

欬逆呃噫日夜不定 畢澄茄高良薑各等分為末每服二錢

水六分煎十沸入酢少許服之蘇頌圖經

陰毒傷寒四肢逆冷 茱萸一升拌溼絹袋二箇包蒸極熱更

傷寒初得不問陰陽 皂角一挺肥者燒赤為末以水五合和

頓服之陰病極效 千金方

時氣頭痛煩熱 皂角燒研新汲水一中盞姜汁蜜各少許和

二錢服之先以煖水沐浴後服藥取汗即愈 聖惠方

陰毒傷寒心結按之極痛大小便閉但出氣初暖者 急取巴

豆十粒研入麪一錢捻作餅安臍內以小艾炷灸五壯氣達

即通此太師陳北山方也 仁齋直指方

傷寒舌出巴豆一粒去油取霜以紙撚卷內入鼻中舌即收上

普濟方

胸痛傷寒後卒胸膈閉痛 枳實麤炒為末米飲服二錢日二

服 嚴子札
治生方

呃噫 枳殼半兩木香一錢為末每白湯服一錢未止再服 本事方

熱病愈復及交接后發動欲死不能語 庖子三十枚水三升

煎一升服令微汗

梅師方

時行蕤黃 竹葉五升切小麥七升石膏三兩水一斗半煎取

七升細服盡劑愈

肘后方

勞復傷寒後交接勞復卵腫股痛 竹皮一升水三升煮五沸

服汁

朱肱南陽活人書

婦人勞復病初愈有所勞動致熱氣衝胸手足搖擗拘急如中

風狀淡竹青茹半斤栝樓二兩水二升煎一升分二服

活人書

時氣煩燥五六日不解 青竹瀝半盞煎熟數飲之厚覆取

汗

千金方

陽毒狂亂甚者 青布一尺浸冷水貼其胸前

活人書

傷寒熱結六七日狂亂見鬼欲走 大蚓半斤去泥用八溺煮

汁飲或生絞汁亦可

用後方

陽毒結胸按之極痛或通而復結喘促大躁狂亂取生地龍四條洗淨研如泥入生薑汁少許蜜一匙薄荷汁少許新汲水調服若熱熾者加片腦少許即與揉心下片時自然汗出而解不應再服一次神效

傷寒經要

勞復卵腫或縮入腹中絞痛身體重頭不能舉小腹急熱拘急

欲死

蚯蚓二十四枚水一斗煮取三升頓服取汗或以蚯

蚓數升絞汁服之並良

用後方

傷寒毒痢傷寒八九日至十餘日大煩渴作熱三焦有瘡匿下

痢或張口吐舌目爛口舌生瘡不識人用此除熱毒止痢

龍骨半斤水一斗煮四升沉之井底冷服五合漸進之

外臺方

熱病下痢欲死者龍骨半斤研水一斗煮取五升候極冷稍

飲得汗即愈効

肘後方

勞復食復篤病初起受勞傷食致復欲火者 鼈甲燒研水服

方寸匕

肘后方

傷寒血結胸脹痛不可近刺期門穴 蜣蛤滑石甘草各一兩

芒硝半兩為末每服二錢雞子清調服更服桂枝紅花湯發

其汗則愈蓋臙中血聚則小腸壅小腸壅則血不行服此則

小腸通則血流行而胸膈利矣

朱肱活人書

傷寒搖擲出汗不徹手脚搖者 海蛤川烏頭各一兩川山甲

二兩為末酒丸如彈子大捏扁置所患足心下別擘葱白蓋

藥以帛纏定於暖室中熱水浸腳至膝上水冷又添候遍身

汗出為度凡三日一作以知為度

傷寒病在陽當以汗解反以冷水啜之或灌之更益煩熱欲水

不渴者 文蛤五兩為末每服方寸匕沸湯下甚効 仲景

天行不解已汗者 新生鷄子五枚傾盞中入水一鷄子攪渾

以水一升煮沸投入納少醬啜之令汗出愈 許仁則方

傷寒發狂煩燥熱極吞 生雞子一枚效 金鑑

天行嘔逆食入即吐 鷄子一枚水煮三五沸冷水浸少頃吞

之外臺

時行黃疾 金色脚黃雌雞治如食法煮熟食之并飲汁令盡

不過再作亦可少下鹽豉 肘后方

時行黃黃 醋酒浸鷄子一宿吞其白數枚 肘后方

傷寒勞復 抱出卵殼熬令黃黑為末熟湯和一合服取汗出

即愈 出深師方

傷寒時氣 豬膏如彈丸溫水化服日三次 肘后方

少陰下利不止厥逆無脉乾嘔者 葱白四莖乾薑一兩生附

子一枚水三升煮一升八人尿五合猪膽汁一合分服仲景傷寒論

傷寒痲出 猪膽汁若酒各三合鷄子一箇合煎三沸分服汗

出即愈張文仲方

天行熱毒攻手足腫痛欲斷 母猪蹄一具去毛以水一斗葱

白一握煮汁入少鹽漬之肘后

熱病發狂傷寒時氣溫病六七日熱極發狂見鬼欲走 取白

狗從背破取血乘熱攤胸上冷乃去之此治垂死者亦活無

白犬但純色者亦可肘后方

傷寒肢痛手足疼欲脫 羊屎煮汁漬之瘡乃止或加猪膏塗

之亦佳外臺

時疾陰腫囊及莖皆熱腫 羊屎黃蘗煮汁洗之外臺

傷寒勞復 馬屎燒末冷酒服方寸七 聖惠方

傷寒勞復 雄鼠屎二十枚豉五合水二升煮一升頓服 外臺

又勞復散 雄鼠屎二十七枚炮子十四枚枳壳三枚為粗末水一盞葱白二寸豉三十粒煎一盞分三服 活人書

男子陰易及勞復 獬鼠屎兩頭尖者十四枚韭根一大把水

二盞煎一盞溫服得粘汗為効末汗再服 南陽活人方

傷寒黃病 髮髮燒研水服一寸七日三 傷寒類要

天行勞復 含頭垢棗核大一枚良 類要

傷寒初愈欲令不勞復者 頭垢燒研水凡梧子太飲服一丸

外臺秘要

陰陽易病 手足瓜甲二十片中衣襦一片燒灰分三服溫酒

下男用女女用男

勞復食復 人屎燒灰酒服方寸七 千金方

熱病發狂奔走似癲如見鬼神久不得汗及不知人事者 人

中黃八大礮內以泥固濟煨半日去火毒研末新汲水服三

錢未退再服

斗門方

大熱狂渴 乾陳人尿為末于陰地淨黃土中作五六寸小坑

將末三兩匙于坑中以新汲水調勻良久澄清細與飲即

解

寇宗奭行義

熱病咽痛

童便三合含之即止

聖惠方

熱病勞復丈夫熱病後交接復發忽卵縮入腸痛欲火燒女

人月經赤衣為末熟水服方寸匕即定

扁鵲方

陰陽易病後交接卵腫或縮入腹絞痛欲火 婦人陰毛燒

灰飲服仍以洗陰水飲之

聖濟總錄

妊娠傷寒

妊娠傷寒 太尿泥塗腹上乾即易令子不落

妊娠熱病 伏龍肝末一雞子許水調服之仍以水和塗臍方

寸乾又上

傷寒類要

妊娠傷寒壯熱赤斑變為黑斑溺血 艾葉如雞子大酒三升

煮二升半分為二服

傷寒類要

妊娠風寒卒中不省人事壯如中風 熟艾三兩米醋炒極熟

以絹包熨臍下良久即甦

婦人良方

妊娠熱病 葛根汁二升分三服

傷寒類要

妊娠傷寒赤斑變為黑斑尿血者 蔥白一把水三升煮熟服

汁食蔥令盡取汗

傷寒類要

傷寒產後血運欲死 荷葉紅花薑黃等分炒研末童子小使

調服二錢

麗安常
傷寒論

孕婦傷寒大熱煩渴恐傷胎氣

嫩卷荷葉焙半兩蚌粉二錢

半為末每服三錢新汲水入密調服并塗腹上

單胎

鄭氏

妊婦熱病

車輜脂隨意酒服大良

千金方

妊感寒

鯉魚一頭燒末酒服方寸七令汗出

秘錄

妊感寒時行者

大鯽一頭燒灰酒服方寸七無汗腹中緩

痛者以醋服取汗

產乳

妊感寒腹痛

乾魚一枚燒灰酒服方寸七取汗瘥

子母
秘錄

妊時疾冷胎不動

雞子七枚浸井中令冷取出打破吞之

子母
秘錄

妊熱病

青羊屎研爛塗臍以安胎氣

外臺
秘要

妊熱病

井底泥取傳心下及丹田可護胎氣

時珍

卒厥

忤惡卒死

銅器或尾器盛熱湯隔衣熨其腹上冷即易立愈

陳藏器
本中

卒中惡氣

伏龍肝末一雞子大水服吐

千金方

客忤中惡多於道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣冲心脇

不即治殺人

搗墨水和服二錢

肘后方

中惡心痛

錒墨五錢鹽一錢研勻熱水一錢調下

千金方

尸厥不醒脉動如故

竈突墨彈丸漿水和飲仍針百會足大

趾中趾甲側

千金方

客忤中惡道間門外得之令人心腹刺痛氣衝心脇脹滿不治

害人真丹方寸匕蜜三合和灌之

肘后方

客忤卒死

真丹方寸匕蜜三合和灌之

肘后方

卒中尸遁其狀腹脹急冲心或塊起或牽腰脊者是服 鹽湯

取吐 孫真
人方

鬼擊中惡 鹽一盞水二盞和服以冷水嚥之即甦 救急
方

中惡心痛或連腰臍 鹽如鷄子大青布裹燒赤納酒中頓服

當吐惡物愈 甄權藥
性論

卒死壯熱 礬石半斤水一斗半煮湯浸脚及踝即得甦 肘后
方

中惡心痛 苦參三兩苦酒一升半煮取八合分二服 肘后
方

卒中五尸其狀腹脹急不得氣息上冲心脇旁攻二脇或魄

礪涌起或牽引腰脊此乃身中尸鬼接引為害取屋上 四

角茅入銅器中以三尺帛覆腹着器布上燒茅令熱隨痛追

逐跣下痒即瘥 肘后
方

鬼擊中惡卒然着人如刀刺狀脇腹內疔刺切痛不可接或

即吐血鼻中出血下血一名鬼排 以熟艾如鷄子大三枚

水五升煎二升頓服

附后

卒中五尸 藜蘆子搗末蜜丸胡豆大每服二丸日三服

附后

卒死不寤 半夏末吹鼻中即活

南岳夫人紫靈魏元君方也

鬼擊身青作痛 金銀花一兩水煎飲之

李樓怪病奇方

卒中客忤 菖蒲根搗汁含之立止

附后

卒然中惡 大豆二七枚鷄子黃一箇酒半升和勻頓服

金

鬼擊卒死 吹醋少許入鼻中

金

鬼擊諸病卒然著人如刀刺狀腦脇腹內切痛不可抑接或吐

血鼻血下血一名鬼排 以醇酒吹兩鼻內良

附后

卒然中惡 搗韭汁灌鼻中便甦

食醫心鏡

卒中惡死或先病或平居寢卧奄忽而死日是中惡 急取葱

黃刺入鼻孔男左女右八七八寸鼻目血出即甦又法用葱五寸以鼻中血即活也如無血出即不可治矣相傳扁鵲秘方也崔氏纂要

卒中惡死卒死或先病或平居寢卧奄忽死死皆是中惡以

薤汁灌入鼻中便有方

中惡心痛 吳茱萸五合酒三升煮沸分二服楊氏產乳

中惡心痛 桂二兩水一升二合煮八合頓服之千金

飛尸鬼擊中惡心痛腹脹大便不通 巴豆二枚去皮心熬黃

杏仁二枚以綿包椎碎熱湯一合捻取白汁服之當下而瘳

量老小用之外臺走馬湯

中鬼昏厥四肢拳冷口鼻出血 久汚溺衣燒灰每服二錢沸

湯下男用女女用男趙原陽員濟急

卒中忤惡鬼氣卒倒不知人逆冷口鼻出清血或脇腹內絞

急切痛如鬼擊之狀不可按摩或吐血衄血久垢汗衫燒

灰百沸湯酒服二錢男用女女用男中觀衣亦可

時珍

鬼打及強鬼排突人中惡者鐵椎柄和桃奴鬼箭等丸服之

之

藏器

鬼打卒死取二三寸刀鞘燒末水服腰刀者彌佳

藏器

卒忤不語真珠末用鷄冠血和丸小豆大以三四粒納口中

肘后

卒中惡死或先病痛或卧而忽絕並取雄鴨向死人口斷其

頭瀝血入口外以竹筒吹其下部極則易人氣通即活也

肘后

鬼擊卒死烏鷄冠血瀝口中令燕仍破此鷄搗心下冷乃棄

之道邊妙

肘后

卒然忤死不能言鷄冠血真珠凡小豆大約三四丸入口中

効_{肘后}

鬼排卒死

烏雄鷄血塗心下即甦

_{風俗通}

卒中惡死

刺豬尾取血飲並縛豚枕之即活

_{肘后}

卒中惡死

破白狗撮心上即活

_{肘后}

鬼擊之病脇腹絞痛或即吐血衄血下血一名鬼排白犬頭

取熱血一升飲之_{方一}

卒死不省四肢不收

取牛洞一升和溫酒灌之或以濕者絞

汁亦可_{肘后}

鬼擊吐血

黃犢子臍屎一升和酒三升煮汁服

_{時珍}

卒死尸厥

白馬前脚夜目三枚白馬尾十四莖合燒以苦酒

丸如小豆大白湯下二丸須臾再服即甦

_{肘后}

卒中惡死

白馬溺絞汁灌之

_{時珍}

卒中惡死吐利不止不知是何病不拘大人小兒 馬糞一升

絞汁灌之乾者水煮汁亦可

肝

中忤中惡鬼氣其證或暮夜登廁或出郊驀然倒地厥冷掘奉
口鼻出清血須臾不救似乎尸厥但腹不鳴心腹暖爾勿移
動令人圍繞 燒火打鼓或燒蘇合香安息香麝香之類候
醒乃移動 犀角五錢麝香硃砂各二錢五分為末每水調
二錢服即効華他方

中惡客忤項強欲死 麝香少許乳汁塗見口中取効醋調亦

可

廣利方

鬼擊吐血脰腹刺痛

鼠屎燒末水服方寸匕不省者灌之

肘后方

諸毒卒惡熱悶欲死者

新糞汁水和服或乾者燒末漬汁飲

名破棺湯

蘇恭

中惡不醒

令人尿其面上即甦

附

此方乃治中惡之聖藥也。凡遇此症，不論男女老幼，服之立效。其法：取人尿，不拘新舊，滴在患者鼻下，或滴在額上，或滴在口中，隨處滴之，無不神效。此乃天賜之良方，不可不備也。

霍亂吐瀉勿食熱物 飲冷水一盞仍以水一盆浸兩足立止

救急方

霍亂不吐不利脹痛欲死 地漿三五盞服即愈大忌米湯千金方

霍亂轉筋 以器盛湯熨之仍令蹋器使足底熱徹冷則易嘉祐本草

霍亂吐下 酸漿水煎乾薑屑呷之手經

吐瀉霍亂者 以東壁土新汲水攪化澄清服之即止蓋脾主喜燥而

惡濕故取太陽真火所照之上引真火生發之氣補土而勝濕則吐瀉自止也

霍亂煩悶 向陽壁土煮汁服聖濟錄

霍亂吐下 鍋底墨煤半錢竈額上墨半錢百通口服一二口

立止 經驗方

霍亂吐利 屋下倒掛座滾湯泡澄清服即止衛生易簡

伏暑霍亂傷冷吐利煩濕 水浸丹用巴豆十五箇去皮心及

油黃丹炒研一兩二錢半化黃蠟和凡綠豆大每服五七丸

水浸少頃別以新汲水吞下

和劑方

霍亂轉筋身冷心下微溫者朱砂研二兩蠟三兩和凡著火

籠中熏之周圍厚覆勿令烟洩兼狀下著火令腹微煖良久

當汗出而甦

外臺秘要

霍亂吐逆不問虛實冷熱水銀硫黃等分研不見星每服一

字至半錢生薑湯調下

二氣散一名青金丹

霍亂滑石燒四兩藿香一錢丁香一錢為末米湯服二錢

普濟

方玉液散

乾霍亂病上不得吐下不利鹽一大匙熬令黃童子小便一

升合和溫服少頃吐下即愈

霍亂腹痛炒鹽一包熨其心腹令氣透又以一包熨其背

救急方

霍亂轉筋欲死氣絕腹有暖氣者 以鹽填臍中灸鹽上七壯

即甦救急方

冷熱霍亂分利陰陽 玄精石半夏各一兩硫黃三錢為末麴

糊丸梧子大每米飲服三十丸指南方

霍亂吐瀉 硫黃一兩胡椒五錢為末黃蠟一兩化九皂子大

每涼水下一丸聖濟方

霍亂吐瀉 枯白礬末一錢百沸湯調下華佗危病方

霍亂嘔惡 人參二兩水一盞半煎汁一盞入鷄子白一枚再

煎溫服一加丁香衛生家寶方

霍亂煩悶 人參五錢桂心半錢水二盞煎服聖惠方

霍亂吐瀉煩躁不止 人參二兩橘皮三兩生薑一兩水六升

煮三升分三服聖濟總錄

霍亂轉筋腹痛 木香末一錢木瓜汁一錢八熱酒調服

聖濟總錄

霍亂吐利 火炙高良薑令焦香每用五兩以酒一升煮三四

沸頓服亦治腹痛

中惡外臺

霍亂腹痛 高良薑一兩剉以水三大盞煎二盞半去滓入粳

米一合煮粥食之便止

聖惠方

霍亂嘔甚不止 高良薑生剉二錢大棗一枚水煎冷服立定

名水壺湯

普濟方

霍亂煩渴 艸豆蔻黃連各二錢半烏豆五十粒生薑三片水

煎服之

聖濟總錄

霍亂吐利 肉豆蔻為末薑湯服一錢

普濟方

霍亂轉筋 香薷單煮服之若四肢煩令汗出而渴者加蓼子

同煮服

霍亂脹滿未得吐下 生蘇槀汁飲之佳乾蘓煮汁亦可附后

霍亂吐下不止 以艾一把水三升煮一升頓服外聖秘要

霍亂成痢 劉奇奴草煎汁飲聖濟總錄

霍亂煩悶 蘆根三爰麥門冬一爰水煎服千金方

霍亂脹痛 蘆根一升生薑一升橘皮五兩水八升煎三升分

服太平聖惠方

霍亂煩渴腹脹 蘆葉一握水煎服○又方蘆葉五爰糯米二爰半竹茹一爰水煎八

薑汁蜜各半合煎兩沸時時呷之聖惠方

霍亂煩渴 藜子一兩香薷二兩每服二爰水煎服聖惠方

霍亂轉筋 蓼葉一升水三升煮取汁二升八香豉一升更煮

二升分半三服藥性論

霍亂吐利 扁竹八豉汁中下五味煮羹食食醫心鏡

霍亂吐泄不止 附子重七錢者炮去皮臍為末每服四錢水

二盞鹽半錢煎一盞溫服立止

孫兆秘寶方

霍亂腹脹

半夏桂等分為末水服方寸匕

肘后方

霍亂吐利

防己白芷等分為末新汲水服二錢

聖惠方

胃暑霍亂小便不利頭運引飲 三白散澤瀉白朮白茯苓各

三錢水一盞薑五片燈心十莖煎八分溫服

霍亂脹痛

生薑蒲剉四兩水和搗汁分溫四服

聖惠方

霍亂心煩

蘆根炙一兩半水萍焙人參枇杷葉炙各一兩每

服五錢八薤白四寸酒煎溫服

聖惠方

霍亂煩渴不止

糯米三合水五升蜜一合研汁分服或煮汁

服楊氏

產乳

霍亂吐瀉煩渴欲絕

粳米二合研粉八水二錢研汁和淡

竹瀝一合頓服

普濟方

霍亂煩躁 黃梁米粉半升水升半和絞如白粉頓服

外臺方

霍亂大渴不止多飲則殺人 黃梁米五升水一斗煮清三升

稍稍飲之

肘后方

霍亂不止 白梁米五合水一升和煮粥食

千金方

霍亂脹痛 大豆生研水服方寸匕

普濟方

霍亂吐利 綠豆粉白糖各二兩新汲水調服即愈

生生編

霍亂吐利 豌豆三合香菜三兩為末水三盞煎一盞分二服

聖惠方

霍亂吐利 扁豆香薷各一升水六升煮二升分服

千金方

霍亂轉筋 白扁為末醋和服

普濟方

霍亂 同蘆擇人參倉米等分煎服

時珍方

霍亂大渴能殺人 以黃梁米三升水一升煮汁澄清飲良 永類
錄方

霍亂吐利鹽醋煎服甚良 如宜

霍亂煩脹未得吐下 以好苦酒三升飲之 千金
方

霍亂煩躁坐卧不安 葱白二十莖大棗二十枚水三升煎二

升分服 漢
方

霍亂乾嘔不止者 以薤一虎口以水三升煮取一半頓服不

過三作即已 韋宙
獨行方

霍亂脹滿不得吐下名乾霍亂 小蒜一升水三升煮一升頓

服 肘
後方

霍亂轉筋入腹殺人以小蒜鹽各二兩搗傳臍中灸七壯立止

聖濟
錄

乾濕霍亂轉筋 大蒜搗塗足心立止 永類
錄方

霍亂吐瀉 芥子搗細水和傳臍上聖惠

霍亂脹痛 蕪菁子水煮汁飲之頻湖集簡方

霍亂欲死 生薑五兩牛兒屎一升水四升煎二升分再服即

止梅師方

霍亂轉筋入腹欲死 生薑三兩搗酒二升煮三兩沸服仍以

薑搗貼痛處外臺秘要

霍亂腹脹不得吐下 生薑一斤水七升煮二升分三服肘后方

霍亂吐利 鹽梅煎湯細細飲之如宜方

霍亂腹痛 桃葉三升切水五升煮一升分二服外臺

霍亂吐利 梨枝煮汁飲之聖惠方

霍亂吐瀉不止轉筋腹痛 棠梨一握同木瓜二兩煎汁細呷

之聖惠方

霍亂轉筋 木瓜一兩酒一升煎服不飲酒者黃湯服仍煎湯

侵青布裏其足 聖惠方

霍亂腹痛 木瓜五錢桑葉三片棗肉一枚水煎服 聖惠方

霍亂煩躁氣急 每嚼木瓜核七粒溫水嚥之 聖惠方

霍亂吐瀉不拘男女但有一點胃氣存者服之 再生廣陳皮

去白五錢真藿香五錢水二盞煎一盞時時溫服 出百一〇聖惠方

用陳橘皮末二錢湯點服不省者灌之仍燒磚沃醋布裏磚安心下慰之便活

乾霍亂病心腹脹痛不吐不利煩悶欲死 檳榔末五錢童子

小便半盞水一盞煎服 聖濟總錄

霍亂吐利 胡椒三十粒以飲吞之 孫真又方胡椒四十粒綠豆一百四十九粒

研勻水心湯服一錢 直指方

霍亂乾嘔不止 吳茱萸泡炒乾薑炮等分水煎之 聖濟綠

霍亂煩悶 茶末一錢煎水調乾薑末一錢服之即安聖濟總錄

霍亂煩渴 藕汁一鍾薑汁半鍾和勻飲聖濟總錄

霍亂轉筋 柏葉搗爛裏脚上及煎汁淋之聖惠方

霍亂轉筋 以煖物裏脚後以柏木屑煮湯淋之經驗方

乾霍亂痛不吐不下 丁香十四枚研末以沸湯一升和之頓

服不瘥更作思邈千金方

霍亂腹痛 厚朴湯厚朴炙四兩桂心二兩枳實五枚生薑二

兩水六升煎取二升分三服陶隱居方

中惡霍亂 海桐皮煮汁服之聖濟總錄

霍亂煩悶 槐葉桑葉各一錢炙甘草三分水煎服之聖惠方

霍亂轉筋 皂角末吹豆許八鼻取嚏即安深師方

伏暑霍亂傷冷吐利煩濕 巴豆二十五箇去皮心及油黃丹

炒研一兩二錢半化黃蠟和九綠豆大每服五七丸水浸少

頃別以新汲水吞下

和劑方

乾霍亂病心腹脹痛不吐不利欲死巴豆一枚去皮心熱水研服得吐利即定

霍亂轉筋八腹煩悶

桑葉一握煎飲一二服立定

聖惠方

霍亂轉筋心腹滿未得吐下 卮子二七枚燒研熟酒服之立

愈

肘后方

霍亂

轉筋

八腹無可奈何者

以酢煮青布搦之冷則易

千金方

霍亂轉筋腹痛

以苦酒煮絮裹之

聖惠方

霍亂吐利

偷木人頭櫓以百沸湯服一呷勿令知之

集聖方

霍亂轉筋

故麻鞋底燒赤投酒中取汁服

陳藏器本草

霍亂吐瀉出路在家應急方

路旁破草鞋去兩頭洗三四次

水煎湯一盞滾服之即安

事海文山

霍亂轉筋入腹痛

敗小梳一枚燒灰酒服永瘥

千金方

霍亂轉筋垂死者

敗蒲席一握切漿水一盞煮汁溫服

聖惠方

霍亂轉筋入腹痛

車轂中脂塗足心

千金方

霍亂吐利

蠟一彈丸熱酒一升化服即止

肘后方

霍亂不通脹悶欲死因傷飽取涼者雄雀糞二十一粒研末

溫酒服未效再次

總錄

霍亂病吐下已斷汗出而厥四肢厥急脉微欲絕者通脉四

逆湯加豬膽汁主之

蓋陽氣太虛陰氣獨勝無與陽藥恐陰氣格拒不得入故加豬膽汁苦入心而

通脉寒補肝而和陰不致格拒也

霍亂厥逆服烏牛尿二升

千金方

霍亂吐下不止四肢厥冷黃牛屎半升水二升煮三沸服半

升止外臺

中惡霍亂及鬼擊吐血 以黃犢子臍屎一升和酒三升煮汁

服出肘后

霍亂吐利不止 烏牛齒草一團人參生薑各三兩甜漿水半

煮汁五合服劉涓子遺方

中惡霍亂 麝香一錢醋半盞調服聖惠方

乾霍亂病脹滿煩躁 亂髮一團燒灰鹽湯二升和服吐良方

霍亂困篤 童女月經衣和血燒灰酒服方寸匕百方不瘥者

用之千金方

痢疾

赤白痢下

甘草一尺炙劈破以淡漿水蘸水一升半煎取八

合服之立效

崔宣州方

○甘草一兩炙肉苁蓉七個煨剉水

三升煎一升分服

冷痢厥逆六脉沈細

人蔘大附子各一兩半每服半兩生薑

十片丁香十五粒粳米一撮水二盞煎七分空心溫服

經驗方

下痢禁口

人蔘蓮肉各三錢并華水二盞煎半細呷之或

加姜汁炒黃連三錢

經驗良方

老人虛痢不止不能飲食

人蔘一兩鹿角去皮炒研五錢為

末每服方寸匕米湯調下日三服

十便長方

瘡瀉久痢

蒼朮二兩川椒一兩為末醋糊丸梧子大每服二

十丸食前溫水下惡痢久者加桂

保命集

血痢不止 貫衆五錢煎酒服 集簡方

血痢不止 地榆曬研每服二錢摻在羊血上炙熟食之以捻

頭煎湯送下○一方地榆煮升作飲每服三合 董濟

赤白下痢骨立者 地榆一斤水三升煮一升半去滓再煎如

稠餲絞濾空腹服三合日再服 崔亮海

熱痢下重 白頭翁二兩黃連黃柏奉皮各三兩水七升煮二

升每取一升不愈更服○婦人產後痢虛極者加甘艸阿膠

各二兩 仲景金匱玉函方

下痢咽腫春夏病此 白頭翁黃連各一兩木香二兩水五升

煎一升半分三服 聖惠方

赤痢血痢 三七三錢研末米泔水調服即愈 集簡方

熱毒血痢 黃連一兩水二升煎半露一宿空腹熱服少卧將

息一二日即止 千金方

赤痢久下累治不瘥 千金方 黃連一兩雞子白和為餅炙紫為末以漿水三升慢火煎成膏每服半合溫米飲下 一方只以雞

子白和丸服 勝金方

熱毒赤痢 黃連二兩切瓦焙令焦當歸一兩焙為末入麝香

少許每服二錢陳米飲下 本草方

赤白久痢並無寒熱只日久不止 黃連四十九個鹽梅七箇

入新瓶內燒烟盡熱研每服二錢鹽米湯下楊子建護命方

赤白暴痢如鷺鴨肝者痛不可忍 黃連黃芩各一兩水二升

煎一升分三次熱服 經驗方

下痢腹痛赤白痢下令人下部疼重故名重下日夜數十行臍

腹絞痛 黃連一升酒五升煮取一升半分再服當止絞痛

也附後方

赤白諸痢裏急後重腹痛 黃連青木香等分搗篩白蜜丸梧

子大每服二三十九丸空腹飲下日再服其效如神久冷者以煨蒜搗和

丸之不拘大人嬰兒皆効 簡易方黃連茱萸炒過四兩木香麝煨二

兩粟米飯丸 錢仲陽方治小兒冷熱痢加煨熟訶子肉劉

小兒瀉痢加煨肉豆蔻 又治小兒氣虛瀉痢腹痛加白附子火 劉

河間治久痢加龍骨 朱丹溪治禁口痢加石蓮肉 王氏

治痢渴加烏梅肉以阿膠化和為丸

濕痢腸風赤白下痢日夜無度 川黃連去毛吳茱萸湯泡各

二兩同炒香揀出各為末粟米飯和丸梧子大各收每服三

十丸赤痢甘艸湯下黃連丸白痢薑湯下茱萸丸赤白痢各

用十五丸米湯下 局方二味加白芍同炒研蒸餅和丸服

血痢不止

胡黃連烏梅肉竈下土等分為末臘茶清下

普濟

熱痢腹痛

胡黃連末飯九梧子大每米湯下三十丸

鮮于樞

血痢不止

苦參炒焦為末水九梧子大每服十五丸米飲下

孫氏仁存堂方

下痢腹痛

玄胡索末三爇溫酒調下

少頃大便行而痛遂止

久痢不止

當歸二兩吳茱萸一兩同炒香去萸不用為末密

九梧子大每服三十丸米飲下

普濟方

冷滑下痢不禁虛羸

糯米砂仁熬為末以羊子肝薄切拌之瓦

上焙乾為末入乾薑末等分飯九梧子大每服四十丸白湯

服藥論

脾泄氣痢

豆蔻一顆米醋調麴果煨令焦黃和麴研末更以

檀子炒研末一兩相和又以陳廩米炒焦為末和勻每以二

芟煎作飲調前二味三錢朝暮各一服便瘥續傳信方

冷痢腹痛不能食者肉豆蔻一兩去皮醋和麪裹煨搗末每

服一錢粥飲調下聖惠方

水瀉久痢破故紙炒一兩粟殼炙四兩為末煉蜜丸彈子大

每服一丸薑棗同水煎服百一選方

產後下痢大荆芥四五穗於盞內燒存性不得犯油火入麝

香少許以沸湯些須調下此藥雖微能愈大病不可忽之深

師方

血痢不止薄荷葉煎湯常服普濟

芩花小白痢陳北艾四兩乾薑炮三兩為末醋炙倉米糊丸梧

子大每服七十丸空心米飲下甚有奇效永類

諸痢久下艾葉陳皮等分煎湯服之亦可為末酒煮爛飯和

九每盞湯下二三十丸

聖濟總錄

赤白痢下 五月五日采青蒿艾葉等分同豆豉搗作餅日乾

每用一餅以水一盞半煎服

聖濟總錄

赤白痢困重者 益母草日乾陳豆梅燒存性等分為末每

服三錢白痢乾薑湯赤痢甘草湯下

衛生家寶方

小兒疳痢墮死者 益母草嫩葉同米煮粥食之取足以差為

度甚佳飲汁亦可

廣利方

霍亂成痢 劉寄奴草煎汁飲

聖濟總錄

赤白下痢陰陽交帶不問赤白 劉寄奴草烏梅白薑等分水

煎服亦加梅白加薑

艾元英方

赤白下痢 雞冠花煎酒服赤用紅白用白

集簡方

冷勞泄痢 漏蘆一兩艾葉炒四兩為末米醋三升入藥末一

半同熬成膏八後末和九梧子大每溫水下三十丸聖惠方

赤白下痢 蒼耳草不拘多少洗淨用水煮爛去滓入蜜用武

火熬成膏每服一二匙白湯下醫方摘玄

產後諸痢 蒼耳葉搗絞汁溫服半中盞日三四服聖惠方

血痢不止 木賊五兩水煎溫服一日一服聖惠方

小兒蟲痢 生苳汁一升二合分三四服立效子母秘錄

痢下腸蠱凡痢下應先白後赤若先赤後白為腸蠱 牛膝二

兩搗碎以酒一升漬經一宿每服一兩盞日三服肘後方

下痢口渴引飲無度 麥門冬去心三兩烏梅肉二十箇細剉

以水一升煮取七合細呷之必效

下痢赤白 淡竹葉菜煎湯日服之活幼金書

血痢產痢 冬葵子為末每服二錢入臘茶一錢沸湯調服日

三聖惠方

血痢不止 地膚子五兩地榆黃芩各一兩為末每服方寸匕

溫水調下 聖惠方

熱痢不止 車前葉搗汁入蜜一合煎溫服 聖惠方

赤白下痢 龍牙草五爻陳茶一撮水煎服神效 醫方摘安

產後瀉痢 小龍牙根一握濃煎服之甚效即蛇含 斗門方

久痢休息時止時作 鼠尾草花搗末飲服一爻 聖惠方

赤白下痢腹痛腸滑後重 大黃煨半兩茛菪子炒黑一撮為

末每服一爻米飲下 普濟方

久痢不止變種 痢兼脫肛 茛菪子一升淘去浮者煮令芽

出曬乾炒黃黑色大棗一升去皮核燉醋二升同煮搗膏丸

梧子大每服二十九丸食前米飲下 聖惠方

水泄久痢 川烏頭二枚生用一以黑豆半合同煮熟研丸綠

豆大每服五丸黃連湯下普濟方

久痢赤白 川烏頭一個灰火燒烟盡取出地上蓋蓋良久研

末酒化蠟丸如大麻子大每服三丸赤痢黃連甘草黑豆煎

湯放冷吞下白痢甘草黑豆煎湯冷吞如瀉及肚痛以水吞

下並空心服之忌熱物經驗良方

久痢休息 熟附子半兩研末鷄子白二枚搗和丸梧子大傾

入沸湯煮數沸漉出作兩服米飲下聖濟總錄

下痢欬逆 川烏頭乾薑等分切炒放冷為散每服一錢水一

盞鹽一撮煎取半盞溫服孫兆口訣

此一名漏蘆子与蔓

一切惡痢雜下及休息痢 木鼈子一名漏蘆子与蔓一箇大者阿膠木香黃連

此部木鼈子不同

罌粟殼各半兩俱炒焦存性入乳香小許為末糊丸梧子大

亦每一歲一九米飲下 衛生寶鑑

水泄寒痢 大草烏 兩以一半生研一半燒灰醋糊和丸

豆大每服七丸并華水下忌生冷魚肉 十便良方

泄痢注下清濁不分或赤或白腹臍刺痛裏急後重 草烏頭

三箇去皮尖一箇火炮七箇醋煮一箇燒灰為末醋糊丸

豆大每服二十丸水瀉流水下赤痢甘州湯下白痢薑湯下

忌魚腥生冷 和劑局方

痢疾禁口 木鼈仁六箇研泥分作二分用麴燒餅一箇切作

兩半只用半餅作一竅納藥在內乘熱覆在病人臍上一時

再換半箇熱餅其痢即止遂思飲食 邵真人經驗方

久痢五色 大熟瓜薑一箇煨存性出火毒為末作一服溫酒

服之 本事方

下痢赤白

山豆根末蜜丸梧子大每服二十九空腹白湯下

三服自止

備急方

久痢成疳

葦草末以管吹入肛門中不過數次如神

熱毒血痢

忍冬藤濃煎飲

聖惠方

血痢不止

麻子仁汁煮綠豆空心飲極效

外臺

泄痢不固

白麴一斤炒焦黃每日空心溫水服一二匙

正要

禁口痢疾

蕎麥麴每服二錢沙糖水調下

坦仙方

下痢禁口

糯穀一升炒出白花去殼用薑汁拌濕再炒為末

每服一匙湯下三服即止

經驗良方

寒痢白色

炒麴每以方寸匕入粥中食之能療日瀉百行師

不救者

外臺

此當在不固上

赤痢熱躁

粳米半升水研取汁入油瓷瓶中蠟紙封口沉井

底一夜平旦服之 普濟方

脾虛泄痢 青梁米半升神麴一合日三煮粥食之即愈 卷九

赤痢不止 秫米一把鯽魚鮓二箇葱白一虎口煮粥食之 普

濟方

泄痢赤白 罌粟子炒罌粟殼炙等分為末煉蜜丸梧子大每

服三十丸米飲下百一選方

熱痢便血 罌粟殼醋炙一兩陳皮半兩為末每服三錢烏梅

湯下 普濟方

久痢不止 罌粟殼醋炙為末蜜丸彈子大每服一九水一盞

薑三片煎八分溫服 ○ 又方 罌粟殼十兩去膜分作三分一

九莢子大每服三十丸米湯下 ○ 又 罌粟殼蜜炙厚朴薑制各四兩為

久痢 阿芙蓉小豆許空心溫水化下日一眼忌葱蒜漿水若

渴飲蜜水解之集要

赤白痢下 鴉片木香黃連白朮各一分研末飯九小豆大壯

者一分老幼半分空心米飲下忌酸物生冷油膩茶酒麪無

不止者口渴畧飲米湯人壘藥花未開時外有兩片青葉包之花開即落收取為末每米飲服

一錢神效赤痢用紅花者白痢用白花者

水痢不止 大豆一升炒白朮半兩為末每服三錢米飲下指南方

赤痢臍痛 黑豆萊菔子二件搓摩吞嚥之良經驗

水穀痢疾 小豆一合鎔蠟三兩頓服取効必効方

赤痢不止 大麻子水研濾汁煮綠豆食之極効粥食亦可必効方

一切泄痢 白扁豆花正開者擇淨勿洗以滾湯瀹過和小豬

脊脂肉一條葱十根胡椒七粒醬汁拌勻就以瀹豆花汁和

麪包作小饊飽食之必用食治方

傷寒暴痢

豉一升薤白一握水三升煮薤熟納豉更煮色黑

去豉分為二服

藥性論

血痢不止

豉大蒜等分杵丸梧子大每服三十九鹽湯下

氏博

血痢如刺

豉一升水漬相淹煎兩沸絞汁頓服不差再作藥

性論

休息久痢

白豆腐醋煎食之即愈

血痢不止

地榆晒研為末每服二錢摻在羊血上炙熟食之

以捻頭煎湯送下或以地榆煮汁熬如飴狀一服三合捻頭

湯化下

下痢赤白

治營衛氣虛風邪襲入腸胃之間便痢赤白臍腹

疼痛裏急後重煩渴脹滿不進飲食乾蒸餅蜜拌炒二兩

御米穀蜜炒四兩為末煉蜜丸芡子大每服一丸水一盞煎

化熱服 傳信適用妙方

水痢百起 六月六日麴炒黃馬蘭子等分為末米飯服方寸

七無馬蘭子用牛骨灰代之 普濟方

赤白痢下水穀不消 麴熬粟米粥服方寸七日四五服 附后

水穀痢疾 韭葉作羹粥煉炒任食之良 食醫心鏡

赤白下痢 葱白一握細切和米煮粥日三食之 食醫心鏡

赤痢不止 薤同黃蘗煮汁服之 陳藏器

赤白痢下 薤白一握同米煮粥日食之 食醫心鏡

寒瘧冷痢 端午日以獨頭蒜十箇黃丹二錢搗丸梧子大每

服九丸長流水下甚妙 普濟方

泄瀉暴痢 大蒜搗貼兩足心亦可貼臍中 千金方

下痢禁口及小兒泄痢方並同上

血痢腹痛日夜不止 薑薑葉搗汁二合八蜜一合溫服聖惠方

下痢禁口 蘿菹搗汁一小盞蜜一盞水一盞同煎早一服午

一服日晡米飲吞阿膠丸百粒如無蘿菹以子搗汁亦可一

方加枯礬七分同煎一方只用蘿菹菜煎湯日飲之○又

葛花不拘新舊染蜜食之鹽汁味淡再換○痢後腸痛方同上

冷痢不止 生薑煨研為末共乾薑末等分以醋和麪作餽飩

先以水煮又以清飲煮過停冷吞二七枚以粥送下日一度

食療

寒痢青色 乾薑切大豆大每米飲服六七枚日三夜一累用

得効肘后方

血痢不止 乾薑燒黑存性放冷為末每服一錢米飲下神妙

下痢禁口

山藥半生半炒為末每服二錢米飲下

衛生易簡方

久痢不止

茄根燒灰石榴皮等分為末以沙糖水服之

簡便單方

精熱瀉痢

冬瓜葉嫩心拖麪煎餅食之

海上名方

酒痢便血腹痛或如魚腦五色者乾絲瓜一枚連皮燒研空

心酒服二錢一方煨食之俗名魚鱔是也

經驗良方

新久洩痢

乾木耳一兩炒鹿角膠二錢半炒為末每服三錢

溫酒調下日二

御藥院方

血痢下血

木耳炒研五錢酒服即可亦用井花水服或以水

煮鹽醋食之以汁送下

寶濟方

泄痢口渴

烏梅煎湯日飲代茶

扶壽精方

赤痢腹痛

陳白梅同真茶蜜水各半煎飲之

直指

○又烏梅肉州黃

連各四兩為末煉蜜丸梧子
大每米飲服二十九日三服

聖濟總錄
便痢膿血 烏梅一兩去核燒過為末每服二錢米飲下立止

久痢不止腸垢已出肘後 烏梅肉二十個水一盞煎六分食

前分二服

○又烏梅肉白梅肉各七個搗爛入乳香末少許
梓九梧桐子大每服二三十九茶湯下日三

水痢不止 林檎半熟者十枚水二升煎一升并林檎食之食

醫心鏡

腸滑久痢 酸石榴一箇煨烟盡出火毒一夜研末仍以酸榴

一箇煎湯服神効無比

痢血五色或膿或水冷熱不調 酸石榴五枚連子搗汁二升

每服五合神妙 聖濟

赤白痢下腹痛食不消化者 酸榴皮炙黃為末棗肉或粟米

飯和九梧子大每空腹米飲服三十粒日三服以知為度如

寒滑加附子赤石脂各一倍○又附子用皮燒存性為末每米飲服方寸七日三服效止

腸滑久痢石榴一箇劈破炭火簇燒存性出火毒為末每服

一錢別以酸石榴一瓣水一盞煎湯調服經驗方

久痢久瀉陳石榴皮酢者焙研細末每服二錢米飲下患二

三年或二三月百方不效者服之便止不可輕忽也普濟方

赤白下痢酢榴根東生者一握炙乾水二大盞濃煎一盞空

心服之斗門

赤痢不止胡桃仁枳壳各七箇皂角不蛀者一挺新瓦上燒

存性研為細末分作八服每臨卧時一服二更一服五更一

服荊芥茶下總錄

血痢不止橡實二兩楮葉炙一兩縮砂仁半兩為末每服一

效食前為梅湯調下 聖惠方

下痢脫肛 橡斗子燒存性研末猪脂和傅 直指方 ○ 煨橡斗

性研末猪脂和搽并煎汁洗之 直指方

赤白久痢不拘大人小兒 新槲皮一斤去黑皮切以水一斗

煎取五升去滓煎膏和酒服

久痢不止 槲白皮薑汁炙五度一兩乾薑炮半兩為末每服

二錢米飲酒下 聖惠總錄

赤白痢 荔枝壳橡斗殼炒石榴皮炒甘草炙各等分每以半

兩水一盞半煎七分溫服日二服 普濟方

久冷下痢或不痢腰腹若冷 蜀椒三升酢漬一宿麴三升同

椒一升拌作粥食不過三升瘥 千金方

赤白下痢 胡椒綠豆各一歲一粒為漢糊丸梧子大紅用生

薑白用米湯下

集簡方

下痢水泄 吳茱萸炮炒黃連炒各二錢水煎服未止再服

聖惠方

赤白下痢脾胃受溼下痢腹痛米穀不化 吳茱萸黃連白芍

藥各一兩同炒為末蒸餅丸梧子大每服二三十丸米飲下

又赤白痢日夜無度及腸風下血川黃連二兩吳茱萸二兩湯泡七次同炒香揀出各自為末粟米飯乾薑湯下茱萸蓮丸

每服三十丸赤痢用十五丸米湯下黃連丸白痢乾薑湯下吳茱萸二

赤白痢各用十五丸米湯下黃連丸白痢乾薑湯下吳茱萸二

兩黃連二兩同炒香各自為末以百州爛末二兩同黃連作

丸以白芍藥末二兩同炒黃連丸白痢乾薑湯下吳茱萸二

赤痢臍痛 茱萸合黑豆湯吞之

千金方

久瀉虛痢腹痛者 食茱萸子肉豆蔻各一兩陳米一兩半以

米一分同二味炒黃為末一分生碾為末粟米粥丸梧子大

每陳米飲下五十丸日三服

普濟方

熱毒下痢赤白 好茶一斤炙搗末濃煎一二盞服久患痢者

亦宜服之

又脫茶赤痢以密水煎服白痢以連皮自然薑汁入麻油一蜺壳和服須臾腹痛大下即止○又脫茶二盞湯點七分梅肉和丸赤痢甘中湯下白痢烏梅湯下各百丸

下痢禁口

沙糖半斤烏梅一箇水二碗煎一椀時飲之方

久痢禁口

石蓮肉炒為末每服二錢陳倉米調下便覺思食

甚妙加八香連丸九妙丹溪心法

血痢不止

荷葉蒂水煮汁服之活潑方

下痢赤白

荷葉燒研每服二錢紅痢蜜白痢沙糖湯下

蠱痢下血男子婦人小兒大腹下黑血茶脚色或膿血如涎色

下柏葉焙乾為末與黃連同煎為汁服之圖經

三十年痢 赤松上蒼皮一斗為末麩粥和服一升日三不過

一斗救人 聖惠方

血痢瀉血 傷藥燒存性研陳米飯九梧子大每米飯下三十

九 普濟方

下痢水穀久不瘥者 厚朴三兩黃連三兩水三升煎一升空

心細服 梅師方

休息痢疾日夜無度腥臭不可近臍腹撮痛 椿根白皮訶黎

勒各半兩母丁香三十箇為末醋糊九梧子大每服五十丸

米飲下 焙又椿根白皮東南行者長流水內漂三日去黃皮

又立秋前後患痢兼腹痛 糲米飯一大兩搗篩

心米飲下 以好麴掩作餅飢如兒子大水煮熟每日空心

臟毒下痢赤白 香椿洗刮取皮日乾為末飲下一莛立效 經驗方

血痢下血 臘月日未出時取背陰地北引檟根皮東流水洗

淨掛風處陰乾為末每二兩入寒食麴二兩新汲水丸梧子

大陰乾每服三十丸水煮滾傾出溫水送下忌見日則無效
普濟方

血痢連年

秦皮鼠尾艸蕎麥根等分以水煎取汁銅器重釜

煎成丸梧子大每服五六丸日二服稍增以知為度亦可煎

飲千金方

下痢不止諸藥不效服此三服宿垢去盡即變黃色屢驗 皂

角子瓦焙為末米糊丸梧子大每服四五十丸陳茶下醫方摘要

傷風下痢風傷久不已而下痢膿血日數十度 皂角刺枳實

水炒槐花生用各半兩為末煉蜜丸梧子大每服三十丸米

湯下日二服袖珍方

下痢禁口 肥皂莢一枚以鹽實其內燒存性為末以少許入

白米粥內食之即效乾坤生意

氣痢水瀉

訶黎勒十枚麩裹煨火煨熟去核研末啗飲頓服

亦可飯丸服一加木香○

又訶黎勒陳橘皮厚朴各三兩搗篩蜜九大如梧子每服二三十九

白湯圖經本草

水瀉下痢

訶黎勒炮二分肉豆蔻一分為末米飲每服二錢

聖惠方

下痢轉白

訶子三箇二炮一生為末沸湯調服水痢加甘艸

末一錢普濟方

赤白下痢

訶子十二箇六生六煨去核焙為末赤痢生甘艸

湯下白痢炙甘艸湯下不過再服

趙原陽治急方

水穀痢下

檳榔皮燒研水服方寸匕

近效方

積滯泄痢腹痛裏急

杏仁去皮尖巴豆去皮心各四十九箇

同燒存性研泥溶蠟和丸綠豆大每服二三丸煎大黃湯下

間日一服一加百艸霜三錢

劉守真宣明方

氣痢赤白 巴豆一兩去皮心熬研以熟豬肝凡綠豆大空心

米飲下三四丸量人用此

方經驗

一切瀉痢脉浮洪者多日難已脉微小者服之立止 巴豆皮

楮葉同燒存性研化蠟丸綠豆大每甘艸湯下五丸

劉河間宣明方

老少瘴痢日夜百餘度者 乾楮葉三兩熬搗為末每服方寸

匕烏梅湯下日再服取羊肉裹末納肛中痢出即止

楊炎南行方

血痢血崩 楮樹皮荊芥等分為末冷醋調服一錢血崩以煎

七服神效

危氏得方

順氣止痢 枳殼炒二兩四錢甘艸六錢為末每沸湯服二錢

嬰兒百問

熱毒血痢 庖子十四枚去皮搗末蜜丸梧子大每服三九日

三服大效亦可水煎服

肘后方

久痢不止 罌粟殼醋炒金櫻花葉及子等分為末蜜丸芡子

大每服五七丸陳皮煎湯化下

普濟方

赤白下痢五六年者 荆瀝每日服五合

外臺秘要

下痢噤口 紅木槿花去蒂陰乾為末先煎麩餅二個蘸末食

之趙宜真濟急方

殮泄滑痢不止 白茯苓一兩木香煨半兩為末紫蘇木煎湯

下二錢

百一選方

毒痢膿血六脉微小並無寒熱 桑寄生二兩防風大芎二錢

半炙甘艸三銖為末每服二錢水一盞煎八分

和滓服楊子建護

命方

血痢不止 白糝三張裹鹽一匙燒赤研末分三服米飲下

聖惠方

熱瀉下痢

五倍子一兩枯礬五錢為末糊九梧子大每服五

十丸米湯送下

鄧莘岑
雜興方

瀉痢不止

五倍子一兩半生半燒為末糊九梧子大每服三

十丸紅痢燒酒下白痢水酒下水泄米湯下○

又五倍子末
每米飲服一錢

集聖

滑痢不止

五倍子醋炒七次為末米湯送下

脾泄久痢

五倍子炒半斤倉米炒一升白丁香細辛木香各

三錢花椒五錢為末每服一錢蜜湯下日二服忌生冷魚肉

集聖方

赤痢不止

文蛤炒研末水浸烏梅肉和九梧子大每服七十

丸烏梅湯下

酒痢下血

五倍子陳槐花等分焙研末酒糊九梧子大每服

五十丸米飲送下

本事方

熱痢吐食因服熱藥而致者

糞中蛆流水洗淨晒乾為末每

服一匙米飲下

赤白下痢噤口痢及泄瀉

蜣螂燒研每服半匙或一匙燒酒

調服小兒以黃酒服立效

李延壽方

毒痢禁口

水蛙一箇并腸肚搗碎尾烘熟入麝香五分作餅

貼臍上氣通即能進食也

久痢休息不止者

龍骨四兩打碎水五升煮取二升半分五

服冷飲仍以米飲和丸每服十丸

肘后方

下痢裏急

穿山甲蛤粉等分同炒研末每服一匙空心溫酒

下善治方

血痢禁口

活鯽魚翅側穿孔去腸留鱗入白礬末二匙以棧

包紙裹煨存性研末每服二錢米飲下每日二服直指方

赤痢不止 鯽魚鮓二錢切秫米一把薤白一虎口切合煮粥

食之聖惠

痢及瀉血 烏龜肉以沙糖水拌椒和炙煮食之多度即愈普濟方

血痢內熱 海蛤末蜜水調服二錢日二傳信

禁口痢疾 大田螺二枚搗爛入麝香三分作餅烘熟貼臍間

半日熟氣下行即思食甚効 丹溪

赤白下痢 白雄雞一隻如常作臠及餽飽空心食 心鏡

下痢禁口 黃肥雌雞一隻如常為臠作濕餽飽空心食 心鏡

脾虛滑痢 黃雌雞一隻炙以鹽醋塗煮熟食之 心鏡

禁口痢疾 鷄內金焙研乳汁服之

下痢赤白 生雞子一箇取白攤連紙上日乾摺作四重包肥

烏梅十箇安熨斗中以白炭燒存性取出碗覆冷定研末入水銀粉少許大人分二服小兒三服空心并華水調下如覺微利不須再服

類澄

赤白下痢 雞卵一枚取黃去白入胡粉滿殼燒存性以酒服

一爻七

葛氏方

脾虛下痢日夜不止 野雞一隻如食法入橘皮葱椒五味和

作餽飽煮空心食之

食醫心鏡

赤白痢下

臘月取雀兒去腸肚皮毛以巴豆仁一枚入肚內

餅固濟煨存性研末以好酒煮黃蠟百沸取蠟和凡梧子大

每服一二十丸紅痢甘艸湯下白痢乾薑湯下

普濟方

休息痢疾

殭豬肝一具切片杏仁炒一兩於淨鍋內一重肝

一重杏仁入童子小便二升文火煎乾取食日一次

千金

赤白下痢腰痛之食醫心鏡 猪腎二枚研爛入陳皮椒醬作餽飽空心食

腸熱血痢

猪大腸一條入芫荽在內煮食

救急○又猪臟入黃

爛搗九梧子大每

○又猪臟入槐花末合酒縛定以醋炙爛

赤白下痢

十二月猪膽百枚俱盛黑豆入內着麝香少許陰

乾每用五七粒為末生薑湯調服奇效方

濕匿下痢不止乾嘔羸瘦多瞤面赤 猪膽汁和薑汁釀醋同

灌下部捻令醋氣上至咽喉乃止當下五色惡物及虫而愈

也拾遺

下痢紅白

臘猪骨燒存性研末溫酒調服三錢

下痢腹痛

狗肝一具切入米一升煮粥合五味食心鏡

赤白下痢

臘月狗膽一百枚每枚入黑豆九滿麝香少許每

服一枚赤以甘艸白以乾薑湯送下

奇效良方

赤白久痢 臘月狗頭骨一兩半燒灰紫筍茶末一兩為末每

服二錢米飲下

聖惠方

胃寒下痢 羊肉一斤薤菜子末一兩和以綿裹納下部二度

瘡

外臺方

下痢腹痛 羊脂阿膠蠟各二兩黍米二升煮粥食之

千金

休息痢疾五十日以上一二年不瘥變成疰下如汨淀者 生

羊肝一具切絲入三年醋中吞之心悶則止不悶更服一日

勿食物或以薑蘼同食亦可不過二三具

外臺

洞注下痢 羊骨灰水服方寸匕

千金方

大腸冷痢 泔牛角鯁燒灰飲服二錢日二次

水穀痢疾 牛骨灰同六月六日麴炒等分為末飲服方寸匕

張文仲方

疳痢垂死

新牛屎一升水一升攪澄汁服不過三服必效方

久痢赤白

馬糞一丸燒灰水服肘后方

血痢不止

乳腐一兩漿水一鍾煎服普濟方

赤白痢疾腸胃氣虛冷熱不調下痢赤白裏急後重腹痛小便

不利

阿膠炒過水化成膏一兩黃連三兩伏苓二兩為末

搗九梧子大每服五十丸粟米湯下日三

和劑局方

水痢不止

朽骨灰六月六日麴炒等分為末飲服方寸七張文

仲方

朽骨不分何骨並赤當取所知無毒之骨可也

休息痢疾經年不愈

虎骨炙黃焦搗末飲服方寸七日三取

効

張文仲方

下痢鮮血

犀角地榆生地黃各一兩為末煉蜜丸彈子大每

服一九水一升煎五合去滓溫服

聖惠方

虛痢危困因血氣衰弱者

鹿茸酥炙一兩為末入麝香五分

以燈心煮棗肉和九梧子大每空心米飲下三五十丸

濟生方

五色痢疾

楮皮燒灰酒服二錢

壽域方

下痢休息

杏仁去皮麪炒研以猪肝一具切片水洗血淨寘

淨鍋中一重肝一重杏仁鋪盡以童便二升同煎乾放冷任

意食之

聖惠方

瘧疾

虛瘧發熱 人參二錢二分雄黃五錢為末端午日用機矢搗

丸梧子九錢日侵辰井華水吞下七丸瘧前再服忌諸般熱

物立效一方加神麴等分 丹溪纂要

溫瘧不止 當歸一兩水煎飲日一服 聖濟總錄

虛瘧自汗不止 草果一枚麩裹煨熟連麩研入平胃散二錢

水煎服 經效濟世方

氣虛瘧瘧熱少寒多或單寒不熱或虛熱不寒 艸米仁熟附

子等分水一盞薑七片棗一枚煎半盞服 溫生方

脾寒瘧疾寒多熱少或單寒不熱或大便洩而小便多不能食

艸果仁熟附子各二錢半生薑七片棗肉二枚水三盞煎一

盞溫服 醫方大成

瘧疾寒熱 青蒿一握水二升搗汁服之 ○ 又五月五日天未明時米青蒿陰乾

四兩桂心一兩為末末蒸前酒服二錢○又端午日采青蒿
葉陰乾桂心等分為末每服一錢先寒用熱酒先熱用冷酒
發日五更服經驗方
之切忌藥物

溫瘧痰甚但熱不寒 青蒿二兩童子小便浸焙黃丹半兩為

末每服二錢白湯調下 存仁方

久瘧不瘥 蒼耳子或根莖亦可焙研末酒糊丸梧子大每酒

服三十丸日二服生者搗汁服亦可 萊氏集驗方

勞瘧積久不止者 長牛膝一握生切以水六升煮二升分三

服清早一服末發前一服臨發時一服 外臺秘要

老瘧不斷 牛膝莖葉一把切以酒三升漬服令微有酒氣不

即斷更作不過三劑止 肘后方

痰瘧邪熱 冬葵子陰乾為末酒服二錢午日取花按手亦去

瘧 聖惠方

瘰癧邪熱 蜀葵花白者陰乾為末服之午日取花按手亦能

去瘰 蘇頌圖經本艸

瘰癧寒熱 馬鞭艸搗汁五合酒二合分二服 千金方

瘰癧不止 葫蘆一大握炙令赤色以水濃煎一盞欲發前服

斗門方

瘰癧疾不止 莨菪根燒灰水服一合量人強弱用 千金方

截瘰諸湯 常山三兩漿水三升浸一宿煎取一升欲發前頻

服取吐○常山一兩秫米一百粒水六升煮三升分三服先

夜未發臨發時服盡○又萬一無吐者 常山酒煮晒乾知

母貝母艸果各一爻牛水一鍾半煎半熟五更熱服渣以酒

浸發前服 卷生論 ○

截瘰諸酒 常山一兩酒一升漬二三日分作三服平旦一服

少頃再服臨發又服或加甘艸煮服之附后○又治間日瘧

恒山一錢二分大黃二錢半炙甘艸一錢二分水一盞半煎

減半醉發日五更溫服再以水一盞煎減半日醺未發時溫

服宋俠心錄○又治久瘧不止常山一錢半檳榔一錢丁香

五分烏梅一箇酒一盞浸一宿五更飲之一服便止永不

發如神虞搏醫學正傳○

截瘧諸丸數年不瘥者兩劑瘥一月以來者一劑瘥恒山三

兩研末鷄子白和丸梧子大瓦器煮熟殺腥氣則取曬乾收

之每服二十丸竹葉湯下五更一服天明一服發前一服或

吐或否即止千金○又恒山搗末三兩真丹一兩研白蜜和

杵百下丸梧子大先發時三丸少頃再服三丸臨時服三丸

酒下無不斷者附○又大小久瘧恒山二兩黃丹半兩烏

梅連核尾焙一兩為末糯米粉糊丸梧子大每服三五十丸

涼酒下隔一夜一服平朝一服午後方食增世榮活幼心書○又恒

山三兩知母一兩甘艸半兩搗末為丸梧子大先發時服十

九次服七丸後服五六丸以瘡為度葛洪肘方○又一切瘡

常山四兩炒存性艸果二兩炒存性為末薄糊丸梧子大每

卧時冷酒服五十丸五更再服忌鷄羊熱物和劑局方○又一切

瘡胸膈停痰痰不愈者常山八兩酒浸蒸焙檳榔二兩生

研末糊丸梧子大如上法服○又諸瘡不拘遠近大小鷄

骨恒山鷄心檳榔各一兩生研鯪鯉甲煨焦一兩半為末糯

粉糊丸萊豆大黃丹為衣每服三五十丸如上法服集簡方

厥陰肝瘡寒多熱少喘息如死狀或少腹滿小便如膿不問久

近不吐不泄如神恒山一兩醋浸一夜尾器煮乾每用二

芎水一盞煎半盞五更冷服

趙真人
急方

太陰肺癰痰聚胸中病至令人心寒甚乃熱間善驚如有

所見恒山三芎甘艸半芎秫米三十五粒水二鍾煎一鍾

芎日早分三次服

千金方

少陰腎癰淒然寒手足寒腰脊痛大便秘難目眇然恒山

二芎半芎兩傷梅一芎竹葉一芎半葱白三根水一升半

煎一升芎前分三服

千金方

牝癰獨寒不熱者蜀漆雲母煨三日夜龍骨各二芎為末每

服半芎臨芎日早一服發前一服酢漿水調下溫瘧又加蜀

漆一芎

張仲景金
匱要畧

牡癰獨熱不冷者蜀漆一芎半甘艸一芎麻黃二芎牡蠣粉

二芎水二鍾先煎麻黃蜀漆去沫入藥再煎至一鍾未芎前

溫服得吐則止王肅外臺秘要

溫瘧熱多 恒山一爻小麥三爻淡竹葉二爻水煎五更服甚

良藥性論

三十年瘧及積年久瘧 常山黃連各一兩酒三升漬一宿以

瓦釜煮取一升半肘后日早服五合肘后發時再服熱當吐冷當利

無不瘥者方又恒山一兩半龍骨五爻附子炮二爻半

大黃一兩為末雞子黃和九梧子大末發時五

丸白湯下支太醫云此方神驗無不新者備張文仲

瘧瘧寒熱 常山一寸枳果一枚熱酒一盃浸一夜五更望東

服之益卧酒醒即愈劉長春又常山檳榔甘艸各二爻黑

豆一百粒水煎服之談桂翁又常山黃連香豉各一兩附

子炮七爻搗末蜜丸梧子大空腹飲服四丸欲發時三九至

午後乃食

葛穉川
肘后方

久瘧痰多不食欲吐不吐

黎蘆末半爰溫蘼水調下探吐

保命集

痰瘧積瘧

黎蘆皂莢炙各一兩巴豆二十五粒熬黃研末蜜

丸小豆大每空心服一丸未發時一丸臨發時又服一丸勿

用飲食

肘后

脾寒瘧疾五臟氣虛陰陽相勝發為瘧瘧寒多熱少或但寒不

熱附子一枚炮七次鹽湯浸七次去皮臍分作二服水一

碗生薑七片棗七枚煎七分露一宿發日空心溫服未久再

進一服

王璆百一選方云寒瘧宜附子風痰宜烏頭若用烏

炮多則熱散也○又熟附子去皮州果仁各二爰半水

一盞薑七片棗一枚煎七分發日早溫服○又臨發時以醋

和附子塗于背上

肘后方

寒熱瘧疾

附子一枚重五錢者麩煨人參丹砂各一錢為末

煉蜜丸梧子大每服二十九丸未發前連進三服中病則吐或

身體麻木未中病來日再服

龐安常
實金論

瘴瘧寒熱冷瘴寒熱往來頭痛身疼嘔痰或汗多引飲或自利

煩躁

大附子一枚四破每以一片水一盞生薑十片煎七

分溫服

嶺南以啞瘴為危急不過一二日而死醫謂極熱感寒用生附子一味治之多愈得非以熱攻熱而蕪散

回生之藥也

嶺南衛生方

寒瘧積瘧

巴豆一枚去心皮射罔去皮如巴豆大大棗去皮

一枚搗成丸梧子大清朝先發時各服一九白湯下肘後方

脾寒厥瘧先寒後熱名寒瘧但寒不熱而面色黑者名厥瘧寒

多熱少面黃腹痛名脾瘧三者并宜服此

仲傷頭削去皮

沸湯泡二七度以盞蓋良久切焙研稀糊丸梧子大每服三

十朶薑十片棗三枚葱三根煎湯清早服以棗壓之如人行

十里許再一服絕勿飲湯使不發也

蘇東坡良方

久瘧有母木鼈子穿山甲炮等分為末每服三錢空心溫酒

下醫方摘要

新久瘧疾 葛葎草一握去兩頭秋冬用乾者恒山末等分以

淡漿水二大盞浸藥星月下露一宿五更煎一盞分二服以

吐痰愈一名勒蔓

瘧後怪症口鼻中氣出盤旋不散凝如黑蓋色過十日漸至肩

與肉相連堅勝金石無由飲食煎澤瀉湯日飲三盞連服五

日愈

夏子益奇疾方

脾寒瘧疾 石胡荽一把杵汁半盞入酒半盞和服甚効

治瘧不止 火麻葉不問榮枯鍋內文武火慢炒香搗起以紙

蓋之令出汗盡為末臨發前用茶或酒下移病人原睡處其
狀如醉醒即愈○又大麻葉如上法為末一兩加縮砂丁香
陳皮赤各半兩酒糊丸梧子大每酒茶任下五七丸能治諸
瘧壯元氣 普濟方

諸瘧久瘧

用三姓人家寒食麴各一合五月五日午時采青

蒿搗自然汁和九菉豆大臨發日早無根水一九一方加炒

黃丹少許

德生堂

肺瘧寒熱痰聚胸中病至令人心寒甚乃熱善驚如有所見

恒山三錢甘艸半錢秫米三十五粒水煎未發時分作三次

服千金

瘧疾寒熱

煮豉湯飲數升得大吐即愈

用后方

止截瘧疾

小蒜不拘多少研泥入黃丹少許丸如芡子大每

服一丸面東新汲水下至妙

唐慎微

瘡疾寒熱

獨頭蒜炭上燒之酒服方寸七

附

○又茺仁半片

放內關穴上將獨頭蒜搗爛罨之縛住男左女右即止

簡○又

端午日取獨頭蒜煨熟入礬紅等分搗丸芡子大每白湯嚼

下一丸普濟方

寒瘡冷痢

端午日以獨頭蒜十箇黃丹二錢搗丸梧子大每

服九丸長流水下甚妙

普濟方

瘡疾寒熱脾胃聚痰痰為寒熱生薑四兩搗自然汁一酒盃露

一夜于痰日五更面北立飲即止未止再服

易簡

脾寒瘡疾 乾薑高良薑等分為末每服一盞水一盞煎至七

分服

外臺

○又乾薑炒黑為末臨痰時以溫酒服三錢七

瘡瘡痰熱連背項者 茴香子搗汁服之

孫真人方

男女瘡疾 馬齒莧搗扎手寸口男左女右

斷截瘡疾 紫莖一握搗爛絹包周身摩擦得睡有汗即愈臨

炭前一時作之救急易方

熱瘡不止 翹搖杆汁服之廣利方

勞瘡劣弱 烏梅十四枚豆豉二合茺柳枝各一虎口甘艸三

寸生薑一塊以童子小便二升煎一半溫服即止

圖經本艸

瘡疾寒熱 桃仁一百枚去皮尖八砵內研成膏不得犯生水

八黃丹三錢九梧子大每服三丸當炭日面北溫酒吞下五

月五日午時合之忌雞犬婦人見

唐慎微本草

鬼瘡寒熱 樹上自乾桃子二七枚為末滴水九梧子大朱砂

為衣每服一丸侵晨面東并華水下良

聖濟總錄

五種瘡疾 神桃十四枚巴豆七粒黑豆一兩研勻以冷水和

九梧子大朱砂為衣煖日五更念藥王菩薩七遍并華水下

一丸立瘡不過二次妙不可言王隱君神堯即桃實者樹

米之中實者良

瘡疾不已 桃花為末酒服方寸匕良 梅師方

脾寒諸瘡不拘老幼孕婦只兩服便止 真橘皮去白切生薑

自然汁浸過一指銀器內重湯煮乾焙研末每服三錢用隔

年青州棗十箇水一盞煎半盞煖前服以棗下之 適用方

瘡疾寒熱 青皮一兩燒存性研末煖酒服一錢臨時再

服 聖惠方

瘡疾寒熱 瓜蒂二枚水半盞浸一宿頓服取吐愈 千金

瘡瘡寒熱 阿魏臘脂各一豆大研勻以蒜膏和覆虎口上男

左女右 聖濟總錄

食瘡積瘡 巴豆去皮心二爻皂莢去皮子六爻搗丸綠豆大

一服一九冷湯下 肘后方

瘡疾不止 故鞋底去兩頭燒灰并華水服之千金方 即麻鞋底

瘡疾不止 不拘久近車軸垢水洗下麩和丸彈子大作燒餅

未發時食一枚發時又食一枚 聖惠方

瘡疾不止 白殭蠶直者一箇切作七段綿裹為丸硃砂為衣

作一服日未出時面向東用桃李枝七寸煎湯吞下院方

止截瘡疾 蜘蛛一枚同飯搗丸吞之 葛洪方 又蜘蛛一枚着

項上勿令信一爻雄黑豆四十九粒為末滴水為丸

患人知之以信一爻雄黑豆四十九粒為末滴水為丸

截瘡 五月五日取花蜘蛛晒乾絳囊盛之臨期男左女右繫

臂上勿令知之 普濟方

佩襪瘡疾

五月五日收大蝦蟇曬乾紙封絳囊貯之男左女

右繫臂上勿令知之

楊氏家藏方

老瘡不止

龍骨末方寸匕先煑一時酒一升半煮三沸及熱

服盡溫覆取汗即効

肘后

熱瘡不寒

穿山甲一兩乾棗十箇同燒存性為末每服二錢

煑日五更井花水服

楊氏家藏

瘡疾不止

龜版燒存性研末酒服方寸匕

海上方

老瘡勞瘡

鼈甲醋炙研末酒服方寸匕隔夜一服清早一服

臨時一服無不斷者入雄黃少許更佳

肘后

瘡疾寒熱

牡蠣粉杜冲等分為末蜜丸梧子大每服五十丸

溫水下

普濟方

瘡瘡疾

燕屎方寸匕煑日平旦和酒一升令病人兩手捧住

吸氣慎勿入口害人

久瘡不止 蝙蝠七個去頭翅足搗千下丸梧子大每服一丸

清湯下鷄鳴時一丸禺中一丸

范汪方

久瘡不止 蝙蝠一枚炙蛇蛻皮一條燒蜘蛛一枚去足炙鼈

甲一枚醋炙麝香半爰為末五月五日午時研勻入煉蜜和

丸麻子大每溫酒下五丸

聖惠方

五瘡不止 夜明砂末每冷茶服一爰立效○

又瘡發作無時經久不瘡 蟬

蝠糞五十粒殊砂半兩麝香一爰為末糯米飯九小豆大末炭時白湯下十丸

久瘡不止或一日二發或一日二三發或二三日一發 五靈

脂頭垢各一爰古城石灰二爰研末飯九皂子大每服一丸

五更無根水下即止神效方也

海上

瘡發無時 胡椒吳茱萸高良薑各二爰為末以豬脾一條作

膾炒熟一半滾藥一半不滾以墨記定并作餽飢煮熟有藥

者吞之無藥者嚼下一服效

衛生家方

虛寒瘧疾黃狗肉煮臠入五味食之

勞瘧瘧瘴久不愈白狗糞燒灰蕪前冷水服二錢

聖惠方

虛寒瘧疾羊肉作臠餅飽食之更飲酒暖卧取汗

集驗方

邪氣瘧疾黑牛尾燒末酒服方寸七日三服

○又牯牛陰毛七根黃荊葉

七尾縛內關上亦效

鬼瘧不止白驢蹄剉炒砒霜各二分大黃四兩菉豆三分雄

黃一分硃砂半分研丸梧子大末蕪平旦冷水服二丸即止

七日忌油

肘后

邪瘧時作生虎睛一枚臘月豬血少許朱砂阿魏各一分為

末端午日取糲尖七枚和丸黍米大每綿包一丸塞耳中男

左女右方聖惠

勞瘧瘴瘧

野狐肝一具陰乾重五日五更初北斗下受氣為

末糲米作丸菜豆大每以一九緋帛裹繫手中指男左女右

聖惠

鬼瘧寒熱

野狐肝膽一具新瓶內乾下上陰阿魏一分為末醋糊

九茱子大發時男左女右把一九嗅之仍以緋帛包一九繫

手中指聖惠

鬼瘧寒熱

雄狐屎蝙蝠屎各一分為末醋糊九茱子大發時

男左女右手把一九嗅之雄狐屎在竹木及石上犬頭者是也

瘧疾渴甚

童便和蜜煎沸頓服簡便方

瘧癘諸瘧無問新久

童便一升入白蜜二匙攪去白沫頓服

取吐碧綠痰出為妙若不然終不除也聖惠

五言古詩

七
一
五

卷之四

泄瀉

脾虛洩瀉 白朮五錢白芍藥一兩冬月用肉豆蔻煨為末米

飲丸梧子大每米飲下五十九日二丹溪心法

濕瀉暑瀉 白朮車前子等分炒為末白湯下二三錢簡便方

久瀉滑腸 白朮炒茯苓各一兩糯米炒二兩為末棗肉拌食

或丸服之簡便方

老少滑瀉 白朮半斤黃土炒過山藥四兩炒為末飯丸量人

大小米湯服或加人參三錢瀕湖集簡方

老人常瀉 白朮二兩黃土拌蒸焙乾去土蒼朮五錢甘浸炒

茯苓一兩為末米糊丸梧子大每米湯下七八十丸簡便方

脾濕水瀉注下困弱無力水穀不化腹痛甚者 蒼朮二兩白

芍藥一兩黃芩半兩淡桂二錢每服一兩水一盞半煎一盞

溫服脈弦頭微痛去芍藥加防風二兩保命集

暑月暴瀉壯脾溫胃飲食所傷 神麴炒蒼朮米泔浸一夜焙

等分為末糊九梧子大每服三五十丸米飲下

和藷方

殮瀉久痢 蒼朮二兩川椒一兩為末醋糊九梧子大每服二

十丸食前溫水下惡痢久者加桂

保命集

脾積食泄 川黃連二兩為末大蒜搗和九梧子大每服五十

丸白湯下

活人心統

水泄脾泄 宣連一兩生薑四兩同以文火炒至薑脆各自揀

出為末水泄用薑末脾泄用連末每服二錢空心白湯下甚

者不過二服亦治痢疾

博濟方

暴瀉引飲 秦艽二兩甘州炙半兩每服三錢水煎服

聖惠方

腹脹忽瀉日夜不止諸藥不效此氣脫也 益智子仁二兩濃

煎飲之立愈

范氏得效方

暴泄身冷自汗甚則欲嘔小使清脉微弱 華菱肉桂各二錢

半高良薑乾薑各三錢半為末糊丸梧子大每服三十丸薑

湯下 和濟局

久瀉不止 肉豆蔻煨一兩木香二錢半為末棗肉和丸米飲

服四五十丸○又肉豆蔻煨一兩熟附子七錢為末糊丸米

飲服四五十丸○又肉豆蔻煨粟殼炙等分為末醋糊丸米

飲服四五十丸 並百一

老人虛瀉 肉豆蔻三錢麩裹煨熟去麩研乳香一兩為末陳

米粉糊丸梧子大每服五七十丸米飲下 瑞竹堂方

脾腎虛瀉 破故紙炒半斤肉豆蔻生用四兩為末肥棗丸研

膏和丸梧子大每空心米飲服五七十丸○ 本事方加木香二兩

水瀉久痢 破故紙炒一兩粟殼炙四兩為末煉蜜丸彈子大

每服一丸薑棗同水煎服

選百方

霍亂吐瀉垂死者服之回生 藿香葉陳皮各半兩水二盞煎

一盞溫服

選百方

暑月吐瀉 滑石炒二兩藿香二錢半丁香五分為末每服一

二錢浙米泔調服

禹講師經方

暴泄不止 陳艾一把生薑一塊水煎熱服

生生編

驟然水瀉日夜不止欲火不拘男婦 五月五日采麻葉陰乾

為末每服二錢冷水調下勿喫熱物令人悶倒只喫冷物小

兒半錢

楊氏建護命方

即苧麻

風寒泄瀉風氣行於腸胃泄瀉 薤白為末醋糊丸梧子大

每服三十丸白湯下

聖濟總錄

水瀉日久 青州乾棗十個去核入葦荍子填滿札定燒存性

每粟米飲服一錢 聖惠方

老人虛泄不禁 熟附子一兩赤石脂一兩為末醋糊丸梧子

大米飲下五十丸 楊氏家藏方

冷氣洞泄 生川烏頭一兩木香半兩為末醋糊丸梧子大每

陳皮湯下二十九 本事方

臟寒脾泄及老人中氣不足久泄不止 肉豆蔻二兩煨熟大

附子去皮臍一兩五錢為末粥丸梧子大每服八十丸蓮肉

煎湯下 ○又脾胃虛冷大腸滑泄米穀不化之力大附子

今水過兩指取出每個切作三片再同煮半日削去皮切焙為末別以棗肉和丸梧子大每空心米飲服三四十丸

水泄久痢 川烏頭二枚一生用一以黑豆半合同煮熟研丸

綠豆大每服五丸黃連湯下 普濟方

水泄寒痢 大柘烏一兩以一半生研一半燒灰醋糊和丸綠

豆大每服七丸井華水下忌生冷魚肉十便良方

泄痢注下清濁不分泄瀉注下或赤或白腹臍刺痛裏急後重

草烏頭三箇去皮尖以一箇火炮一箇醋煮一箇燒灰為末

醋糊丸綠豆大每服二十丸水瀉流水下赤痢甘艸湯下白

痢薑湯下忌魚腥生冷和劑局方

吐泄不止四肢厥逆虛風不省人事服此則陽回天南星為

末每服三錢京棗三枚水二鍾煎八分溫服未省再服○醋

調南星末 普濟方 貼足心

五更腎泄凡人每至五更即瀉泄一二次經年不止者名曰腎

泄蓋陰盛而然脾惡濕濕則濡而困困則不能治水水性下

流則腎水不足 五味子以強腎水養五臟吳茱萸以除脾

濕則泄自止矣五味子去樓二兩吳茱萸湯泡七次五錢同

炒香為末每朝陳米飲服二錢

許叔微
本事方

水瀉不止 木鼈仁五箇母丁香五箇麝香一分研末米湯調

作膏納臍中貼之外以膏藥護住

吳是扶
壽精方

泄瀉不固 白麪一片炒焦黃每日空心溫水服一二匙

正要

久洩食減 糯米一升水浸一宿漚乾慢炒熟磨篩入懷慶山

藥一兩每日清晨用半盞入砂糖二匙胡椒末少許以極滾

湯調食其味極佳大有滋補久服令人精暖有子

松篁經
方

脾虛泄瀉 青粱米半升神麪一合日日煮粥食即愈

養老
書

久泄胃弱 黃米炒為粉每用數匙沙糖拌食

簡便

泄瀉 瞿粟子炒瞿粟殼炙等分為末煉蜜丸梧子大每服三

十丸米飲下有人經驗

選方

水泄不止 瞿粟殼一枚去蒂膜烏梅肉大棗肉各十枚水一

蓋煎七分溫服 經驗

一切泄瀉 白扁豆花正開者擇淨勿洗以滾湯淪過和小豬

脊肥肉一條葱一根胡椒七粒醬汁拌勻就以淪豆花汁和

麪包作小餛飩炙熟食之 必用食治方

暑月吐瀉 陳倉米二升麥芽四兩黃連四兩切同蒸熟焙研

為末水丸梧子大每服百丸白湯送下

老人泄瀉 乾餹一兩薑湯化代飯 簡便方

暴泄不止 神麴炒二兩吳茱萸湯泡炒半兩為末醋糊丸梧

子大每服五十丸米飲下 選百一方

濕熱泄瀉 六一散加炒紅麴五錢為末蒸餅和丸梧子大每

服五七十丸白湯下日三服 丹溪心法

寒濕泄瀉 小使清者 頭燒酒飲之即止

泄瀉 大蒜搗貼兩足心亦可貼臍中

千金方

中寒水瀉 乾薑炮研末粥飲服二錢即效

千金方

濕熱虛泄

山藥蒼朮等分飯九米飲服大人小兒皆宜

瀕湖經驗方

積熱泄瀉

冬瓜葉嫩心拖麵煎餅食之

海上方

新久洩瀉

乾木耳一兩炒鹿角膠二錢半炒為末每服三錢

溫酒調下日二

御藥院方

泄瀉口渴

烏梅煎湯日飲代茶

扶壽精方

久瀉不止

酸石榴一箇煨烟盡出火毒一夜研末仍以酸榴

一塊煎湯服神效無比

普濟方

久瀉

陳石榴皮酢者焙研細末每服二錢米飲下連二三年

或二三月百方不效者服之使止不可輕忽之也

普濟方

夏月濕瀉

川椒炒取紅肉豆蔻煨各一兩為末粳米飯九粒

子大每量人米飲服百丸

餐瀉不化

川椒一兩炒蒼朮二兩土炒礮末醋糊丸梧子大

每米飲服五十丸普濟

老小洩瀉小兒水瀉及人年五十以上患瀉

川椒二兩醋二

升煮醋盡慢火焙乾礮末礮器貯之每服二錢七酒及米飲下譚氏

夏月冷瀉及霍亂

胡椒礮藻飯丸梧子大每米飲下四十丸

衛生簡

多年脾泄老人多此謂之水土同化吳茱萸三錢泡過八水

煎汁入鹽小許通口服蓋茱萸能煖膀胱水道既清大腸自

固他藥雖熱不能分解清濁也孫氏仁

臟寒泄瀉倦怠減食吳茱萸湯泡過炒猪臟半條去脂洗淨

裝滿紫定文火煮熟搗丸梧子大每服五十丸米飲下日二服普治滑痢不止同治

水泄 吳茱萸炮炒黃連炒各二錢水煎服未止再服聖惠方

久瀉腹痛者 檳子肉豆蔻各一兩陳米一兩半以米一分同

二味炒黃為末二分生碾為末粟米粥丸梧子大每陳米飲

下五十丸日三服普治檳子即食茱萸

脾泄腸滑 石蓮肉炒為末每服二錢陳倉米調下便覺思食

甚妙加入香連丸尤妙心法

中滿洞瀉 厚朴乾薑等分為末蜜丸梧子大每服五十丸米

飲下鮑氏方一方厚朴薑汁炙焦黑為末陳米飲調服二錢七日三服

水瀉訶訶黎勒十枚麩炭煨熟去核研末粥飲頓服亦可

飯丸服一加木香又訶黎勒陳橘皮厚朴各三兩搗篩蜜丸大如梧子每服二三十丸白湯下

水瀉 訶梨勒炮二分肉豆蔻一分為末米飲每服二錢

聖惠方

脾胃氣泄久患不止 蕪荑五兩搗末飯九梧子大每日空心

午飯前陳米飲下三十丸久服去三尺益神駐顏

王紹顏續傳信方

積滯泄瀉腹痛裏急 杏仁去皮尖巴豆去皮心各四十九箇

同燒存性研泥溶蠟和丸綠豆大每服二三丸煎大黃湯下

間日一服一加百草霜三錢

劉守真宣明方

夏月水瀉不止 巴豆一粒針頭燒存性化蠟和丸一丸倒流

水下

危氏得效方

一切泄瀉脉浮洪者多日難已脉微小者服之立止 巴豆皮

楮葉同燒存性研化蠟丸綠豆大每廿叶湯下五丸

蜀河間宣明方

殮泄不止 白茯苓一兩木香煨半兩為末紫蘇木瓜湯下二

錢

百一選方

暑月水泄 五倍子末飯丸黃豆大每服二十丸荷葉煎水下

即時見效 金居士選奇方

熱瀉 五倍子一兩枯礬五錢為末糊丸梧子大每服五十丸

米湯送下 鄒筆峯雜興方

泄瀉不止 五倍子一兩半生半燒為末糊丸梧子大每服三

十丸米湯下 又五倍子末每服一錢

脾泄 五倍子炒半斤倉米炒一升白丁香細辛木香各三錢

花椒五錢為末每服一錢蜜湯下日二服忌生冷魚肉 集靈方

泄瀉不止 白龍骨白石脂等分為末水丸梧子大紫蘇木瓜

湯下量大人小兒用 心鑑

脾虛滑泄 烏骨母雞一隻治淨用豆蔻一兩草果二枚燒存

性摻入雞腹內紮定煮熟空心食之

久泄不止 豬腎一箇批開搥骨碎補末煨熟食之神效

集瀕湖

水瀉不止

豬肚一枚入蒜煮爛搥膏九梧子大每米飲服

三十丸

丁必解云予次日五更必水瀉一次百藥不效用此方入平胃散末三兩九服遂安

普治

臟寒洩瀉體倦食減

豬大腸一條去脂洗淨以吳茱萸末填

滿縛定蒸熟搥九梧子大每服五十丸米飲下

奇效方

或瀉或止久而不愈 黃連黃蘗末各一兩以豬膽煮熟和九

如菉豆大量兒大小每米飲服之

總論微

水洩多時 殺羊角一枚白礬末填蒲燒存性為末每新汲水

服二錢

聖惠方

飲酒成泄骨立不能食但飲酒即泄 嫩鹿茸酥炙肉苁蓉煨

一兩生麝香五分為末陳白米飯九梧子大每米飲下五十

丸 普治方

水泄不化日夜不止 白堊煨乾薑炮各一兩楮葉生研二

兩為末糊凡菴豆大每米飲下二十丸 普濟方

暴作泄瀉 百艸霜末米飲調下二爻 續十全方

泄瀉 棗肉搗爛八黃丹白礬各皂子大糲米飯一團和丸彈

子大鐵線穿於燈上燒過為末米飲服之 摘玄方

伏熱吐瀉 硫黃半兩水錢一兩研墨薑汁糊丸小豆大三歲

三丸冷水下大人三四十丸 鄭氏小兒方

暑毒泄瀉 雄黃不拘多小入棗內線繫定煎湯用鈆一兩化

汁傾入湯內同煮自早至晚不住添沸湯取出為末共棗杵

和丸梧子大每服三十丸煎黑鈆湯空心下只三服止 普濟方

卷之五

詩

上

卷之五

詩

上

卷之五

詩

卷之五

詩

上

卷之五

詩

上

卷之五

詩

卷之五

詩

上

卷之五

詩

上

卷之五

詩

卷之五

詩

上

卷之五

詩

上

卷之五

詩

卷之五

詩

上

卷之五

詩

上

卷之五

詩

卷之五

詩

上

卷之五

詩

上

卷之五

詩

卷之五

詩

上

卷之五

詩

上

卷之五

詩

卷之五

詩

上

卷之五

詩

上

卷之五

詩

卷之五

詩

上

卷之五

詩

上

卷之五

詩

卷之五

詩

上

卷之五

詩

上

卷之五

詩

卷之五

詩

上

卷之五

詩

上

卷之五

詩

卷之五

詩

上

卷之五

詩

上

卷之五

詩

眼疾

眼睛突出一二寸者以新汲水灌漬睛中數易之自入梅師方

時行火眼患人每日於井上視井旋匝三遍能洩火氣集玄方

火眼赤爛緊閉目以熱湯沃之湯冷即止頻沃取安妙在閉

目或加薄荷防風荊芥煎湯沃之亦妙趙原陽方

肝虛目昏多淚或風赤及生翳膜頑厚或病後生白膜失明或

五臟虛勞風熱上衝于目生翳並宜熨烙之法蓋氣血得溫

則宣流得寒則凝澀故也其法用平頭鍼如翳大小燒赤輕

輕當翳中烙之烙後翳破即用除翳藥傳點

去風退赤燒銅匙柄熨烙眼弦內甚妙時珍

風赤爛眼倒睫拳毛白土一兩銅青一錢為末每以半錢泡

湯洗華佗方○加煇硝半兩為末湯泡杏仁秘製丸

秘製丸

目卒無見 黃土攪水中澄清洗之

肘后方

目中翳膜 東壁土細末日點之淚出佳

肘后方

目生翳膜 細料白瓷鍾一箇大火煨過研末紙篩加雄黃二

分為末早晚各點少許不可多用牛角簪撥去翳膜為妙若

紅用人退末點四角即愈

孫天集効方

赤眼腫痛 新磚浸糞池中年久取放陰處生花刷下入腦子

和點之

普濟方

飛絲入目 磨濃墨點之即出

千金方

○塵物入目方上同

風眼爛弦 金環燒紅掠上下瞼肉日數次甚妙

集簡方

爛弦風眼 銅青水調塗盤底以艾熏乾刮下塗爛處

衛生易簡方

三年目翳 胡粉塗之

聖惠方

一切目疾昏障治只障不治 蜂蜜半斤銅鍋熬起紫色塊入

飛過真黃丹二兩水一盞再煉至水氣盡以細生絹鋪薄紙一層濾淨瓶封埋地內三七每日點眼七次藥粘則洗之一

方入訶子肉四箇

保壽堂方

赤眼痛

黃丹蜂蜜調貼太陽穴立効

明目經方

赤目及翳

鉛丹白礬等分為末點之

又方 驗方 鉛丹烏賊魚等分合研白礬煎點之

千金方

眼生珠管

鉛丹半兩鯉魚膽汁和如膏日點三五次

聖惠方

赤目腫痛數日不能開

生薑一塊洗淨去皮以古青銅錢刮

汁點之初甚苦熱淚蔑面然終無損

但作瘡者不可用

○亦治目中障翳腐蝕

肉壞

赤目浮翳

古錢一文鹽方寸七治篩點之

千金方

目卒不見

錢于石上磨汁注眇中

普濟方

目生珠管及膚翳 銅錢青一兩細墨半兩為末醋丸白豆大

每以一九乳汁新汲水各少許浸化點之

聖惠方

身熱目赤 琉璃以水浸冷熨之

目生障翳 生辰砂一塊日日擦之自退

普濟方

目膜息肉 丹砂一兩五月五日研勻銅器中以水漿一盞臘

水一盞浸七日暴乾銅刀刮下再研瓶收每點少許皆上

聖惠方

錄

目生弩肉及珠管 真丹貝母等分為末點注目三四次

附戶方

爛弦風眼 臍粉末口津和點大眦

聖惠方

風邪眼寒乃風入頭系敗血凝滯不能上下流通故風寒客之

而眼寒也 石膏煨二兩川芎二兩甘艸炙半兩為末每服

一錢蔥白茶湯調下日二服

聖惠方

雀目夜昏百治不効 石膏末每服一錢猪肝一片薄批搽藥

在上纚定沙瓶煮熟切食之一日一服

明目方

目暴赤腫 爐甘石火煨尿淬風化硝等分為末新水化一粟

點之

御藥院方

諸般翳膜

爐甘石青礬朴硝等分為末每用一字沸湯化開

溫洗日三次

宣明方

一切目疾

真爐甘石半斤用黃連四兩剉豆大銀石器內水

二盞煮二伏時去黃連為末入半腦二錢半研勻罐收每點

少許頻用取効

又方爐甘石煨一錢盆消一錢為末熱湯泡洗

目暗昏花

爐甘石火煨重尿淬七次代赭石火煨醋淬七次

黃丹水飛各四兩為末白沙蜜半斤以銅鐺鍊去白沫更添

清水五六盞熬沸下藥文武火熬至一盞滴水不散以來紙

濾入瓷甌收之頻點日用

衛生易簡方

爛弦風眼流淚爛弦白爐甘石四兩火煨童尿淬七次地上

出毒三日細研每用椒湯洗目後臨卧點三四次次早以茶

湯洗去甚妙又方爐甘石一斤火煨黃連四兩煎水淬七次

一戔海螵蛸三分為末入巨腦每用點目○又方爐甘石石膏各

甘石二兩以黃連一兩煎水入童尿半盞再煨下朴硝一兩

入鑊成以火煨石淬七次洗淨為末

衛生易簡方

眼昏內障神水寬大漸散昏如霧露中行漸覩空花物成二體

久則光不收及內障神水淡綠淡白色者真磁石火煨醋

淬七次二兩硃砂一兩神麴生用三兩為末更以神麴末一

兩煮糊加密九梧子大每服二十丸空心飯湯下服後俯視

不見仰視微見星月此其效也亦治心火乘金水裏反制之

作倪微德原慈朱丸

機微集

赤眼腫閉 土朱代赭石 二分石膏一分為末新汲水調傅眼頭

尾及太陽穴直指方

目中淚出 鹽點目中冷水洗數次范注方

目中浮翳遮睛 白鹽生研少許頻點屢効小兒亦宜直指方

塵物眯目以少鹽并豉置井中視之立出孫真人方

赤眼腫痛 朴硝置豆腐上蒸化取汁收點簡便方

風眼赤爛明淨皮消一盞水二盞煎化露一夜濾淨澄清朝夕

洗目三日其紅即消雖半世者亦愈也楊誠齋方

退翳明目 馬牙消光淨者厚紙裹實安在懷內着肉養一百

二十日 研粉入少龍腦不計年歲深遠眼生翳膜遠視不明

但瞳人不破散者並宜日點之經驗方 白龍散

諸眼障翳 牙消十兩湯汋汁厚紙濾過尾罷熬乾置地上

夜入飛炒黃丹一兩麝香半分再羅過入腦子日點仙方

眼臉赤腫以人乳和風化硝塗之

赤眼腫痛硝石末臥時以銅筋點黍米大入目背至旦以鹽

水洗去之聖惠方

眼目障翳男女內外障翳或三五箇月不見効者一點復明好

焰硝一兩銅器鎔化入飛過黃丹二分片腦二分銅匙急抄

入罐內收之每點少許其効如神張三作仙方

弩肉瘡突鵬砂黃色者一錢片腦少許研末燈艸蘸點之直指方

目醫弩肉白礬石納黍米大入目令淚出日日用之惡汁去

盡其疾日減外臺秘要

目生白膜礬石一升水四合銅器中煎半合入少蜜調之以

綿濾過每日點三四度姚和衆延齡至寶方

赤目風腫

甘艸水磨明礬傳眼胞上效或用枯礬頻擦眉心

方集簡

爛弦風眼

白礬煨一兩銅青三錢研末湯泡澄清點洗方永類

眼暴赤爛

紅棗五箇入綠礬在內火煨熟以河水井水各一

盞桃柳心各七箇煎稠每點少許入眦上方摘玄

爛弦風眼

青礬火煨出毒細研湯泡澄清點洗方永類

方同

例毛

酒毒目盲一人形實好飲熱酒忽病目盲而脉濡此熱酒所傷

胃氣汚濁血死其中而然蘇木煎湯調人參末一錢服次

日鼻及兩掌皆紫黑此滯血行矣再以四物湯加蘇木桃仁

紅花陳皮調人參末服數日而愈丹溪纂要

肝風眼黑目睛痛肝風盛也桔梗一斤黑牽牛頭末三兩為

木蜜九梧子大每服四十丸溫水下日三服保命集九桔梗

青盲雀目蒼術四兩油浸一夜切焙研末每服三錢猪肝三

兩批開搗藥在內扎定入粟米一合水一碗砂鍋煮熟熏眼臨

臥食肝飲汁不拘大人小兒皆治聖惠方○又方不詳時月久

在內麻扎以粟米油煮氣待冷食之以愈為度

眼目昏濇蒼術半斤油浸七日去皮切焙木賊各二兩為末

每服一錢茶酒任下聖惠方

目昏生翳仙靈脾羊生王瓜小紅色者等分為末每服

一錢茶下日二服聖惠方

病後青盲日近者可治仙靈脾一兩淡豆豉一百粒水一盞

半煎一盞頓服即瘳百一選方

赤脉貫瞳玄蔘為末以米泔煮猪肝日日蘸食之聖惠方

眼目諸病

黃連不限多少槌碎以新汲水一大盃浸六十日

綿濾取汁入原盃內重湯上熬之不住攪之候乾即穿地坑

子可深一尺以瓦鋪底將熟艾四兩坐在瓦上以火然之以

藥盃覆上四畔泥封開孔出烟盡取刮下九小豆大每慈竹

葉湯下十丸勝金黃又方男女肝經不足風熱上攻頭目

兩羊子肝一具去膜搗爛和九梧子大劉禹錫黃連末一

暴赤眼痛 宣黃連剉以雞子清浸置也下一夜次早濾過雞

羽蘸滴目內又在方苦竹兩頭留節一夜次早服竹節內水

加片腦少○乾蓮杏仁等分為末綿包浸湯開目平熱淋洗

爛弦風眼 黃連十文槐花輕粉少許為末男兒乳汁和之飯

上蒸過帛裹熨眼上三四次即効屢試有驗仁存方

目卒痒痛 乳汁浸黃連頻點皆中並治目中百病外障

淚出不止 黃連浸濃汁漬拭之

方 冊後

肝熱生翳不拘大人小兒 黃芩一兩淡豉三兩為末每服三

錢以熟豬肝裹喫溫湯送下日二服忌酒麪

傷生家實方

睂眶作痛風熱有痰 黃芩酒浸白芷等分為末每服二錢茶

下

蒙古家珍

眼目昏暗 柴胡六銖決明子十八銖治篩人乳汁和傅目上

久久夜見五色

千金方

睛垂至鼻人睛忽垂至鼻如黑角塞痛不可忍或時時大便血

出痛名曰肝脹 羌活煎汁服數盞自愈

夏子益奇疾方

冷淚目昏 貝母一枚胡椒七粒為末點之

儒門事親方

目生弩肉 貝母真丹等分為末日點

方 冊後

○又貝母丁香等分為末乳汁調

暑行目澀 生龍膽搗汁一合黃連浸汁一匙和點之危氏得効方

眼中漏膿 龍膽草當歸等分為末每服二錢溫水下鴻飛集

內虛目暗補氣養血 當歸生晒六兩附子火炮一兩為末煉

蜜丸梧子大每服三十丸溫酒下聖濟總錄 六一九

一切眼疾 白芷雄黃為末煉蜜丸龍眼大朱砂為衣每服一

丸食後茶下日二服普濟方 還睛丸

暴赤眼痛以管吹 良薑末入鼻取嚏或彈出鼻血即散談藝錄方

頭風睛痛 香附子二兩藿香葉甘草各二錢為末每服二錢

沸湯入鹽調下聖惠方

肝虛睛痛冷淚羞明 香附子一兩夏枯草半兩為末每服一

錢茶清下簡易方 補肝散

頭目諸疾一切眼疾血勞風氣頭痛頭眩 荊芥穗為末

每酒服三錢

龍樹論

眼弦赤爛 薄荷以生薑汁浸一宿晒乾為末每用一錢沸湯

炮洗

明目經方

飛絲入目令人舌上生泡 紫蘇葉嚼爛白湯嚥之

危氏得方

病後生翳 白菊花蟬蛻等分為散每用二三錢入蜜少許水

煎服大人小兒皆宜屢驗

救急方

眼目昏花 甘菊花一斤紅椒去目六兩為末用新地黃汁和

丸梧子大每服五十九臨臥茶清下

瑞竹堂方

雙美丸

火眼腫痛以艾燒烟起用盥覆之候烟盡盥上刮煤下以溫

水調化洗眼即瘥更入黃連九佳

斗門方

眼熱赤腫 山茵陳車前子等分煎湯細茶調散服數服

直指方

積熱眼澀三月三日或五月五日采青蒿花或于陰乾為末

目珠疼連着稜骨及頭半邊腫痛黃連膏點之反甚至夜反甚
諸藥不効灸厥陰少陽疼隨止半日又作月餘 夏枯艸二
兩香附二兩甘艸四錢為末每服一錢半清茶調服下咽則
疼減半至四五服良愈矣

明目補肝肝虛目睛痛冷淚不止血脉痛羞明怕日 夏枯艸

半兩香附子一兩為末每服一錢臘茶湯調下

簡要
治衆

眼目昏暗 菜耳實一升為末白米半升作粥日食之

普治
方

赤目生瘡作痛 道人頭聾末二兩乳香一錢每用一錢燒烟

嚙鼻

聖
總錄

內外障翳 麻黃根一兩當歸身一錢同炒黑色入麝香少許

為末嚙鼻頻用

普治
方

目昏多淚 木賊去節蒼朮泔浸各一兩為末每服二錢茶調

下或蜜丸亦可

物傷睛突輕者臉胞腫痛重者目睛突出但目系未斷者即納

入急搗生地黃綿裹傳之仍以避風膏藥護其四邊

聖濟總錄

睡起目赤腫起良久如常者血熱也臥則歸於肝故熱則目赤

腫良久血散故如常也 生地黄汁浸粳米半升晒乾三浸

三晒每夜以米煮粥食一盞數日即愈

聖濟餘

眼暴赤痛 水洗生地黄黑豆各二兩搗膏臥時以鹽湯洗目

閉目以藥厚罨目上至曉水潤取下

聖濟總錄

蓐內赤目 生地黄薄切溫水浸貼

小品

內障青盲風赤生翳及墜眼日久瞽損失明 地黃花晒黑豆

花晒槐花晒各一兩為末猪肝一具同以水二斗煮至上有

凝脂掠盡瓶收每點少許三四次

聖惠方

眼生珠管

牛膝並葉搗汁日點三四次

聖惠方

積年失明

決明子二升為末每食後粥飲服方寸匕

外臺秘要

青盲雀目

決明一升地膚子五兩為末米飲丸梧子大每米

飲下二三十九

善溼方

補肝明目

決明子一升蔓菁子二升以酒五升煮暴乾為末

每飲服二錢溫水下日二服

聖惠方

目赤腫痛

決明子炒研茶調傳兩太陽穴乾則易之一夜即

愈

醫方摘玄

風熱赤目

地膚子焙一升生地黃半斤取汁和作餅晒乾研

末每服三錢空心服

聖惠方

目痛眯目凡目痛及眯目中傷有熱瞋者

地膚子白汁頻注

目中

王燾外臺秘要

物傷睛陷弩肉突出 地膚洗去土二兩搗絞汁每點少許冬

月以乾者煮膿汁

聖惠方

目赤腫痛浸淫等瘡 瞿麥炒黃為末以鷺涎調塗皆頭即開

或搗汁塗之

普治方

眯目生翳其物不出者生膚醫者 瞿麥乾薑炮為末井華水

調服二錢日二服

聖惠方

久患內障 車前子乾地黃麥門冬等分為末密丸如梧子大

服之屢試有驗

聖惠方

補虛明目肝腎俱虛眼昏黑花或生障醫迎風有淚久服補肝

腎增目力 車前子熟地黃酒蒸焙三兩兔絲子酒浸五兩

為末煉蜜丸梧子大每溫酒下三十丸日二服

和劑局方

聖惠方

風熱目暗瀉痛 車前子黃連各一兩為末食後溫酒服一錢

日二服 聖惠方

目赤作痛 車前艸自然汁調朴消末臥時塗眼胞上次早洗

去 聖惠方總錄

目中微翳 車前葉枸杞葉等分手中揉汁出以桑葉兩重裹之懸陰處一夜破桑葉取點不過三五度 十便良方

飛血赤目熱痛 乾藍葉切二升車前艸半兩淡竹葉切三握

水四升煎二升去滓溫洗冷即再暖以瘥為度 聖惠方總錄

爛弦風眼 青黛黃連泡湯日洗 明目方

丹石衝眼服丹石人毒發衝眼腫痛 扁竹根一握洗搗汁服

之 食療本艸

三十年失明 蒺藜子七月七日收陰乾搗散食後水服方寸

七日二 外臺秘要

目中翳膜 穀精艸防風等分為末米飲服之甚驗明目方

暴赤目痛 四物湯加大黃酒煎服之傳信通方

眼暴赤腫碇痛不得開淚出不止削 附子赤皮末如蠶砂大

著皆中以定為度張文仲備急方

肝傷目暗 兔絲子三兩酒浸三日暴乾為末雞子白和丸梧

子大空心溫酒下二十九聖惠方

目中赤痛 野狐漿艸搗汁點之聖惠方

爛弦風眼 五味子蔓荊子煎湯頻洗之談野翁種方

目暗不見物冷淚浸淫不止及青盲天行目暗等疾 覆盆子

日曝乾搗極細以薄綿裹之用飲男乳汁浸如人行八九里

久用點目中即仰臥不過三四日視物如少年禁酒麵油物

倒睫拳毛因風入脾經致使風痒不住手擦日久赤爛拳毛入

內 木鼈子仁搗爛以絲帛包作條左患塞右鼻右患塞左

鼻其毛自分上下次服蟬蛻藥為妙

孫天仁集效方

風熱赤眼 白牽牛末以蔥白煮研丸綠豆大每服五丸蔥湯

下服訖睡半時

衛生家寶方

眼熱昏暗 營實藟蒿枸杞子地膚子各二兩為末每服三錢溫

酒下

聖惠方

赤目痛澇不可忍 小圓瓜瓢籬上大如彈丸紅色皮上有刺

者九月十月采日乾槐花炒赤芍藥等分為末每服二錢臨

臥溫酒下

衛生家寶方

目睛暴痛 防己酒浸三次為末每一服二錢溫酒下

摘玄方

諸般赤眼攀睛雲翳 菖蒲搗自然汁文武火熬作膏日點之

效
聖
總錄

眼瞼挑鍼

獨生菖蒲根同鹽研傅

壽域
聖方

飛絲入目

石菖蒲搥碎左目塞右鼻右目塞左鼻百發百中

危氏得
效方

弩肉攀睛

青萍少許研爛入片腦少許貼眼上

危氏得
效方

睫毛倒入

川石斛川芎藟等分為末口內含水隨左右嚙鼻

日二次
神珍方

眼生花翳澀痛難開

景天搗汁日點三五次

聖惠方

雀目夜昏七月七日九月九日

地衣艸陰乾為末酒服方寸

七日三服一月愈

崔知
悌方

麥芒入目

大麥煮汁洗之即出

孫真
人方

頭風風眼

蒿麥作錢大餅貼眼四角以米大艾炷灸之即效

如神

雜物眯目不出 生粟米七粒嚼爛取汁洗之即出 總錄

眼熱赤腫 粟米泔澱極酸者生地黃等分研勻攤絹上方圓

二寸貼目上熨之乾即易 總錄

肝虛目暗迎風下淚 臘月牯牛膽盛黑豆懸風處取出每夜

吞三七粒久久自明 龍木論

雜物眯目不出 豉三七枚浸水洗目視之即出 總錄

赤眼腫痛有數腫皆肝熱血凝也用消風熱藥服之夜用鹽收

豆腐片貼之酸漿者勿用 證治要訣

赤目 燒酒入鹽飲之痛止腫消 又方赤目洗之淚出腫消赤

絡使勢結開而邪熱散此亦反治也

眼暗補中 蔥子半升為末每取一匙煎湯一升半去滓入米

煮粥食之亦可為末蜜丸梧子大食後米湯服一二十丸日

三服 食醫心鑒

目中風翳作痛 蓮白截斷安膜上令遍痛作復為之 范汪方

飛絲入目 白菜揉爛帕包滴汁三二點入目即出 普濟方

芥菜汁點之如神

雀目不見 真紫芥菜子炒黑為末用羊肝一具分作八服每

用芥末三錢捻肝上笋箨裹定煮熟冷食以汁送下 聖錄

目中翳膜 芥子一粒輕手按入眼中少頃以井華水雞子清

洗之 總錄

飛絲入眼 蔓菁菜揉爛帕包滴汁三兩點即出也 普濟方

青盲眼障但瞳子不壞者十得九愈 蔓菁子六升蒸之氣遍

合甌取下以釜中熟湯淋之乃曝乾還淋如是三遍即收并

為末會上清酒服方寸七日再服准元亮方亦同

補肝明目 蕪菁子淘過一斤黃精二斤同和九蒸九晒為末

每空心米飲服二錢日再服又方蕪菁子二升次明子一升和勻以酒五升煮曝乾為末每

服二錢溫水並聖調下日二

風邪攻目視物不明肝氣虛者 蔓菁子四兩入甕瓶中燒黑

無聲取出入蛇蛻二兩又燒成灰為末每服半錢食後酒下

日三服聖濟總錄

暴赤眼腫 古銅錢刮薑取汁于錢唇點之淚出今日點明日

愈勿疑又方暴風客熱目赤睛痛腫者臘月取生薑搗絞汁陰乾取粉入銅青末等分每以少許沸湯泡澄清

溫洗淚出妙

冷淚目昏 乾薑粉一字泡湯點洗之聖濟錄

赤眼澀痛 白薑末水調貼足心甚妙聖濟方

目忽不見令人嚼 母薑以舌日舐六七次以明為度

聖濟錄

目中卒痛 乾薑削圓滑內眥中有汁出拭之未盡更易

千金

目瞖及塵物入目 蘭香子一名羅勒三五顆安目中少頃當濕脹

與物俱出

又主風赤眇淚

○又方為末點之

目昏浮翳 蘭香子每用七個睡時水煎服之久久有效也

上海

方名

暴赤眼痛脹碇澀 薺菜根杵汁滴之

聖惠方

眼生瞖膜 薺菜和根莖葉洗淨焙乾為細末每夜臥時先洗

眼挑末米許安兩大眥頭澀痛忍之久久膜自落也

聖濟總錄

目中息肉淫膚赤白膜 馬齒莧一大握洗淨和芒硝末少許

綿裹安上頻易之

龍本論

眼目昏暗七月七日取 苦瓠白瓢絞汁一合以酢二升古錢

七文同以微火煎減半每日取沫納背脊中神效

千金

弩肉血腎秋間取小柄壺盧或小藥壺盧陰乾於緊小處鋸

斷內穿一小孔如眼孔大遇有此病將眼皮上下用手掙開

將壺盧孔合定初雖甚痛苦然瘀肉血腎皆漸下不傷睛也

劉松石
經驗方

火眼赤痛五月取老黃瓜一條上開小孔去瓢入芒硝令滿懸

陰處待硝透出刮下留點眼甚驗

壽域
神方

眼流冷淚木耳一兩燒存性木賊一兩為末每服二錢以清

米泔煎服

惠濟方

目中赤脉痒痛時見黑花初生杏子仁一升古五銖錢七文

入瓶內密封埋門限下一百日化為水每夕點之

聖濟
總錄

目中翳遮但瞳子不破者杏仁三升去皮麪裹作三包煨火

煨熟去麴研爛壓去油每用一爇入銅綠一爇研勻點之同上
目生弩肉或痒或痛漸覆瞳人 杏仁去皮二爇半膩粉半爇

研勻綿裹筋頭點之同上

傷目生弩 生杏仁七枚去皮細嚼吐於掌中乘熱以綿裹筋

頭點弩肉上不過四五度愈廣利 ○乳又方杏仁研膏人乳化開日點三次

赤目弩肉日夜痛者 好梨一顆搗絞汁以綿裹黃連片一爇

浸汁仰臥點之圖經

赤眼腫痛 鵝梨一枚搗汁黃連末半兩膩粉一字和勻綿裹

浸梨汁中日日點之聖惠

眼目暗昏四月內取風落 小胡桃每日午時食飽以無根水

吞下偃臥覺鼻孔中有汩腥氣為度衛生易簡方

目中障翳 蓼蓂藤以水浸過吹氣取汁滴入目中去熱翳赤

白障

拾遺本抄

眼暴赤腫礮澀疼痛 甘蔗汁二合黃連半兩入銅器內慢火

養濃去滓點之 汁濟

眼赤作痛 蓮實去皮研末一盞粳米半升以水煮粥常食 普濟

塵芒入目 大藕洗搗綿裹滴汁八目中即出也 普濟方

肝虛目淚 鍊成枯脂一斤釀米二斗水七斗麴二斗造酒頻

飲之 摘玄方

腎虛目黑煖水臟 沉香一兩蜀椒去目炒出汗四兩為末酒

糊丸梧子大每服三十九空心鹽湯下 普濟方

目生膚翳 龍腦末一兩日點三五度 聖濟總錄

目赤目膜 龍腦雄雀屎各八分為末以人乳汁一合調成膏

日日點之無有不驗 聖惠方

頭目風熱上攻

龍腦末半兩南蓬砂末一兩頻嚙兩鼻

御藥方

時行赤目

黃蘗去粗皮為末濕紙包裹黃泥固煨乾每用一

彈子大紗帕包之浸水一盞飯上蒸熟乘熱熏洗極效

此方有金

木火土故名五行湯一丸可用三二次

龍本論

眼目昏暗每旦含

黃蘗一片吐津洗之終身行之永無目疾

普濟方

眼見諸物禽蟲飛走乃肝膽之疾

青銅子花酸棗仁玄明粉

羌活各一兩為末每服二錢水煎滓日三服

經驗良

目熱昏暗

槐子黃連二兩為末蜜丸梧子大每漿水下二十

九日二服

聖濟總錄

赤眼生翳

秦皮一兩水一升半煮七合澄清日日溫洗

一方加滑

石黃連等分

外臺秘要

眼暴腫痛 秦皮黃連各一兩苦竹葉半升水二升半煮取八

合食後溫服

此乃謝道方也

外臺秘要

赤眼晴瘡 秦皮一兩清水一升白盃中浸春夏一食頃以上

看碧色出卽以筋頭纏綿仰臥點令滿眼微痛勿畏良久瀝

取熱汁日點十度以上不過兩日瘥也

外臺秘要

眼弦挑鍼乃肝脾積熱判 秦皮夾沙糖水煎調大黃末一錢

微利佳

仁齋直指方

雜物眯目 新桑根皮洗淨搥爛入眼撥之自出

聖惠方

青盲洗法 新研青桑葉焙乾逐月按日就地上燒存性每以

一合於甕器內煎減二分傾出澄清溫熱洗目至百度屢試

有驗正月初八二月初八三月初六四月初四五月初六六

月初二七月初七八月二十九月十二月十三十一月初

二十二月三十

普濟方

武勝軍宋仲孚患此二十年用此法二年目明如故

風眼下淚

臘月不落桑葉煎湯日日溫洗或入芒硝

集簡方

赤眼澀痛

桑葉為末紙卷燒煙熏鼻取效

海上方也

目赤腫痛

桑灰一兩黃連半兩為末每以一錢泡湯澄清洗

之聖濟總錄

洗青盲眼正月八二月八三月六四月四五月五六月二七月

七八月二十九月十二十月十七十一月二十六十二月三

十日每遇上件神日桑柴灰一合煎湯沃之於甕器中澄

取極清稍熱洗之如冷即重湯頓溫不住手洗久久視物如

鷹鵠也

一作法以桑灰童子小便和龍本論作九每用一九泡湯澄洗

飛絲入目

柘漿點之以絲蘸水拭去

醫學綱目

洗目令明

柘木煎湯按日溫洗自寅至亥乃止無不效者正

月初二二月初二三月不洗四月初五五月初五六月十一
七月初七八月初二九月初二十月十九十一月不洗十二

月十四日徐神翁方也

肝熱生翳 楮實子研細食後蜜湯服一錢日再服直指方

目昏難視 楮桃荊芥穗各五百枚為末煉蜜丸彈子大食後

嚼一丸薄荷湯送下一日三服衛生易簡方

一切眼翳 三月收穀木軟葉楮葉曬乾為末入麝香少許每以

黍米大注眚內其翳自落聖惠方

暴赤眼痛礪澀者 嫩楮枝去葉放地火燒以盥覆之一日取

灰泡湯澄清溫洗聖惠方

目中翳膜 楮白皮暴乾作一繩子如釵股大燒灰細研每點

少許日三五次瘥乃止崔氏方

眼風痒或生翳或赤眚一切皆主之 宣州黃連末麤核仁去

皮研膏等分和勻取無艸乾棗二枚割下頭去核以二物填滿却以割下頭合定用少薄綿裹之大茶盞盛于銀器中文武火煎取一雞子大以綿濾罐收點眼萬萬不失前後試驗數十人皆應今醫家亦多用得效也

肝虛風熱上攻眼目昏暗痒痛隱澀赤腫羞明不能遠視迎風有淚多見黑花 麤仁去皮壓去油二兩腦子二錢半研勻生蜜六錢和收點眼和劑局方 春雪膏

一切眼疾 麤仁去油三錢甘州防風各六錢黃連五錢以三味熬取濃汁次下麤仁膏日點孫氏集效方 百點膏

下腎膜 麤仁去油五分青鹽一分猪脂子五錢共搗二千下如泥罐收點之又方麤仁去油一兩入白蓮砂一錢麝香二分研勻收之去醫妙不可言

飛血眼 麤仁一兩去皮細辛半兩苦竹葉三握洗水二升煎

一升濾汁頻濕洗之

聖濟總錄

赤爛眼 麤仁四十九箇去皮胡粉煨如金色一雞子大研勻

八酥一杏仁許龍腦三豆許研勻油紙裹收每以麻子許塗

大小背上頻用取效

又方麤仁杏仁各一兩去皮研勻入膩粉少許為丸每用熱湯化洗

風熱赤眼 冬青子不以多少搗汁熬膏淨瓶收固埋地中七

日每用點眼

濟急仙方

風熱赤眼 冬青葉五斗搗汁浸新磚數片五日掘坑架磚于

內蓋之日久生霜刮下入腦子少許點之

又方黃連二兩冬青葉四兩水浸三

日夜熬成膏收點

一切眼疾 冬青葉研爛八朴硝貼之

海上方也

目瞋息膚 五加皮不聞水聲者搗末一升和酒二升浸七日

一日服二次禁醋二七日遍身生瘡是毒出不出以生熟湯

浴之取瘡愈

千金方

肝虛下淚 枸杞子二升絹袋盛浸一斗酒中密封三七日飲

龍本論

目赤生翳 枸杞子搗汁日點三五次神驗

附后

天行赤目暴腫 地骨皮三斤水三斗煮三升去滓入鹽一兩

取二升頻頻洗點

龍上謝道人天竺經

目濇有翳 枸杞葉車前葉二兩按汁以桑葉裹懸陰處一夜

取汁點之不過三五度

十復良方

赤眼腫痛 芙蓉葉末水和貼太陽穴

鴻飛

清涼膏

目中障翳 密蒙花黃蘗根各一兩為末水丸梧子大每臥時

湯服十九至十五丸

唐濟錄

赤目皆痛不得開者肝經實熱所致或生障翳 苦竹瀝五合

黃連二分綿裹漫一宿頻點之令熱淚出

梅師方

目痛礮瀉不得瞑 青布炙熱以時熨之仍蒸大豆作枕

聖惠方

病後目赤方同○千金方
冷水浸青布掩之數易

目生珠管 生蜜塗目仰臥半日乃可洗之日一次

肘後方

肝虛雀目 黃蠟不拘多少溶汁取出入蛤粉相和得所每用

刀子切下二爇以猪肝二兩批開摻藥在內麻繩扎定水一

椀同入銚子內煮熟取出乘熱蒸眼至溫並肝食之日二以

平安為度其效如神

集驗方

風毒攻眼腫痒至痛不可忍者或上下臉赤爛或浮翳瘀血侵

睛神效 五倍子一兩蔓荊子一兩半為末服二爇水二盞

銅石器內煎汁去滓乘熱洗留滓再煎用大能明目去澀

博濟

風眼赤爛 五倍子煨存性為末入飛過黃丹少許傳之日三

上甚良

普濟

又方五倍子研末傳之

爛弦風眼

五倍子銅青白塼土等分為末熟湯泡開閉目棘

洗冷

下

即熱洗之眼弦不可入湯

濟急方

眼中弩肉方同上

眯目不出

蠶沙揀淨空心以新汲水吞下十枚勿嚼破

聖惠

目中頑翳

青娘子紅娘子斑蝥各二箇去頭足麩炒黃色蓬

砂一錢蕤仁去油五箇為末每點少許日五六次仍同春雪

膏點之

普濟方

發背膏

眼目赤瞎

青泥中蛆淘淨日乾為末令患人仰臥合目每次

用一錢散目上須臾藥行待少時去藥赤瞎亦然

保命集

竹木入眼

蟬螬搗塗之立出

肘后

麥芒入眼以新布覆目中持蟬螬從布上摩之芒着布上出

也千金方

沙塵入目 生蠅娘一枚以其背於眼上影之自出肘后方

勞傷肝氣目暗 螢火二七枚納大鯉魚膽中陰乾百日為末

每點少許極妙一方用白犬膽

目中浮翳 書中白魚末注少許於翳上日二外臺

沙塵入目不出者 杵白魚以乳汁和滴目中即出或為末點

之千金

風赤眼痛 地龍十條炙為末茶服三錢聖惠

赤白翳膜 生蝸牛一枚搗丹砂末于內火上炙沸以綿染汁

傳皆中日聖惠方

目中膚赤熱痛 虻蟲大者洗淨斷之令汁滴目中三十年膚

赤亦瘥藏器並治一切眼疾及生膚翳赤白膜

遠年風眼赤暗 蛇蟲五條日乾為末膩粉一錢石膽半錢為

末點之日二三度

普濟方

火眼赤痛 穿山甲一片為末鋪白紙上捲作繩燒烟熏之

壽域

倒睫拳毛

穿山甲竹刀刮去肉將羊腎脂抹甲上炙黃如此

七次為末隨左右眼用一字嚙鼻內日中噙水日用二次二

月取效

儒門事親

平生腎膜 蛇蛻皮一條洗晒細剪以白麵和作餅炙焦黑色

為末食後溫水服一錢日二次

聖惠方

睛上生暈不問久新 鯉魚長一尺二寸者取膽滴銅鏡上陰

乾竹刀刮下每點少許

總錄

赤眼腫痛 鯉魚膽十枚膩粉一錢和勻瓶收日點

聖濟總錄

又方

鯉魚膽五枚黃連木半兩和勻八蜂窠少許瓶盛安飯上蒸熱每用貼目皆日五七度亦治飛血赤脈

赤目障翳

青魚膽頻頻點之

一方加黃連海螵蛸各等分
又方黃連切片井水熬濃去滓

煎成膏入大青魚膽汁和就入片腦
少許瓶收密封每日點之甚妙

一切障翳

青魚膽鯉魚膽青羊膽牛膽各半兩熊膽二錢半

麝香少許石決明一兩為末糊丸梧子大每空心茶下十九

龍本論

熱病目暗因瘧後食五辛而致

鯽魚作臠食之

集驗方

目生弩肉

鮮鯽魚取一斤中央開竅貼于眶上日三五度

總錄

赤白目翳傷寒熱毒攻眼生赤白翳

烏鰂魚骨一兩去皮為

末八龍腦少許點之

日三方諸目翳為細末熟酒肝切片煎食日二

赤翳攀睛眼翳惟厚者尤効及赤翳攀睛貫瞳人

海螵蛸一

錢辰砂半錢乳細水飛澄取以黃蠟少許化和成劑收之臨

臥時火上旋九黍米大揉入眚中睡至天明溫水洗下未退
更用一次即效

海上方

照水丹

雀目夜眼

烏賊骨半斤為末化黃蠟三兩和捏作錢大餅子

每服一餅以猪肝二兩竹刀批開摻藥札定米泔水半碗煮

熟食之以汁送下

楊氏家藏

血風赤眼女人多之

烏賊魚骨二爇銅綠一爇為末每用一

爇熱湯泡洗

楊氏家藏

迎風目淚乃心腎虛熱也

生瑤瑁羚羊角各一兩石燕子一

雙為末每服一爇薄荷湯下日一服

鴻飛集

雀目夜盲遇夜不能視物

螺兒蚌粉三爇為末水飛過雄猪

肝一葉披開納粉扎定以第二米泔煮七分熟仍別以蚌粉

蘸食以汁送下一日一作

與夜明砂同功

直指方

灰塵迷目 大真珠拭之則明也論格古

肝虛目暗茫茫不見 真珠末一兩白蜜二合鯉魚膽二枚和

合銅器煎至一半新綿漉過瓶盛頻點取瘥聖惠方 青盲不

目生頑翳 真珠一兩地榆二兩雨水二大盞煮乾取真珠以

醋浸五日熱水淘去醋氣研細末用每點少許以愈為度

羞明怕日 千里光石決明殼黃菊花甘枰各一爻水煎冷服明驗

肝虛目翳凡氣虛血虛肝虛眼白俱赤夜如雞喙生浮翳者

海蚌殼燒過成灰木賊焙各等分為末每服三爻用薑棗同

水煎和渣通口服每日服二次經方

青盲雀目 石決明一兩燒過存性外用蒼朮三兩去皮為末

每服三爻以猪肝披開入藥末在內扎定砂罐煮熟以氣熏

目待冷食肝飲汁龍目論

雀目夜盲

真蛤粉炒黃為末以油蠟化和丸梔子大內於猪

腰子中麻紫定蒸食之一日一服

儒門事親

目花腎痛

貝子一兩燒研如麪入龍腦少許點之若有瘰肉

加真珠末等分

千金

目痛累年或三四十生海羸取汁洗之或入黃連末在內

取汁點之

藏器

肝熱目赤

大田螺七枚洗淨新汲水養去泥穢換水一升浸

洗取起於淨器中著少鹽花於甲內承取自然汁點目逐箇

用了放去之

藥性論

爛弦風眼方法同上
但以銅絲代鹽花

雜物眯目不出

雞肝血滴少許即出

聖惠方

肝虛目暗老人肝虛目暗烏雄雞肝一具切以豉和米作羹

成粥食之

養老書

眼熱流淚

五倍子蔓荊子煎湯洗後用雄雞膽點之方摘玄

塵沙眯目

雞膽汁點之醫說

風眼腫痛

雞子白皮枸杞白皮等分為末吹鼻中一日三次

聖濟總錄

內外目障目昏生翳遠視似有黑花及內障不見物 雀兒十

箇去翅足觜連腸胃骨肉研爛磁石煨醋淬七次水飛神麴

炒青鹽肉蓯蓉酒浸炙各一兩兔絲子酒浸三日晒三兩為

末以酒二升少入煉蜜同雀鹽研膏和丸梧子大每溫酒下

二十丸日二服聖惠方

目中翳膜目熱生赤白膜 雄雀屎和人乳點上自爛方附后

內外障翳 夜明砂末批入豬肝內煮食飲汁效道指方

青盲不見 夜明砂糯米炒黃一兩柏葉炙一兩為末牛膽汁

和丸梧子大每夜臥時竹葉湯下二十九至五更米飲下二十九瘥乃止

聖惠

目生浮翳

五靈脂海螵蛸各等分爲細末熟豬肝日蘸食

明

方經驗

雜物入目

豬脂煮取水面如油者仰臥去枕點鼻中不過數

度與物俱出

方聖惠

目難遠視肝虛也

豬肝一具細切去皮膜蔥白一握用豉汁

作羹待熟下雞子三箇食之

方普濟

肝熱目赤癢痛

豬肝一具薄切水洗淨以五味食之

食醫心鏡

撥雲去翳

豬脰子一枚五莖蕤仁五分青鹽一莖共搗千下

令如泥每點少許取下翳膜為效

孫氏集效方

目翳目盲

豬膽文火煎稠丸黍米大每納一粒

方十便

目赤腫痛

豬膽汁一枚和鹽礪五分點之

普濟方

火眼赤痛

豬膽一箇銅錢三文同置于內蒸乾取膽丸粟米

大安眼中

聖惠方

目翳如重者

豬膽皮暴乾作兩股繩如筋大燒灰出火毒點

之不過三五度瘡

外瘡秘要

十年青盲

白犬生于目未開時乳頻點之拘于目開即瘡

藏器

眼赤澀痒

犬膽汁注目中効

聖惠

肝虛目暗

白犬膽一枚螢火虫二七枚陰乾為末點之

聖惠

目中膿水

上伏日采犬膽酒服之

聖濟總錄

傷目青腫

羊肉煮熟熨之

聖惠方

目中赤翳

白羊髓傅之

千金

目赤熱痛看物如隔紗宜補肝益精

青羊肝一具切洗和五

味食之心鏡

肝虛目赤 青羊肝薄切水浸吞之極效龍本論

病後失明方同上

翳膜羞明有淚肝經有熱也 青羊子肝一具竹刀切和黃連

四兩為丸梧子大食遠茶清下七十九日三服忌鐵器豬肉

冷水醫鏡

目病瞢瞢以銅器煮 青羊肝用麵餅覆器上鑽兩孔如人眼

大以目向上熏之不過三度千金方

目病失明 青殺羊肝一斤去膜切片入新瓦內炕乾同決明

子半升蓼子一合炒為末以白蜜漿服方寸七日三不過三

劑目明至一年能夜見文字金療

不能遠視 羊肝一具去膜細切以蔥子一分炒為末以水煮

熟去滓入米煮粥食

多能辦事

青盲內障 白年子肝一具黃連一兩熟地黃二兩同搗丸梧

子大食遠茶服七十九日三服

傳信方

爛弦風赤眼流淚不可近光及一切暴赤目病 羯羊膽一枚

八峰蜜於內蒸之候乾研為膏每含少許並點之一日淚止

二日腫消三日痛定

蓋羊食百草蜂採百花故名

此花膏

病後失明 羊膽點之日二次

肘后

目為物傷 羊膽二枚雞膽三枚鯉魚膽二枚和勻日日點之

聖惠方

目赤及腎膜 羊睛曝乾為末點之

千金

目瞖羞明 熟羊眼中白珠二枚於細石上和棗核磨汁點頻

用三四日瘥

孟詵

塵物入目 羊筋熟嚼細皆中仰臥即出

千金翼

損目破睛

牛口涎日點二次避風黑睛破者亦瘥

肝

眼中瘰肉

驢脂白鹽等分和勻注兩目眦頭日三次一月瘥

千金方

赤目障翳

每以熊膽少許化開入冰片一二片銅器點之絕

奇或淚痒加生薑粉些湏

齊東語

塵沙眯目

鹿筋嚼爛接入目中則粘出

時珍

風熱目暗肝腎氣虛風熱上攻目腫暗

兔肝一具米三合和

鼓汁如常煮粥食

普濟

青盲不見

雄鼠膽鯉魚膽各二枚和勻滴之立效

聖惠方

塵沙眯目

以貂裘袖拭之即出

眼睫倒刺

蝟刺棗針白芷青黛等分為末隨左右目嚙鼻中

口含冷水

瑞竹堂方

飛絲入目

頭上白屑少許揩之即出物類相感志

赤目腫痛

頭垢一芥子納入取淚方摘玄

一切目疾

耳塞晒乾每以粟許夜夜點之聖惠方

飛絲入目

刮瓜甲末同津液點之其絲自聚拔出也危氏得效方

物入目中

左手瓜甲刀刮屑末燈心蘸點翳上三次即出也

一切目疾

並以木賊擦取瓜甲末同朱砂末等分研勻以露

水搜九芥子大每以一粒點入目內聖惠方

目生花翳

刀刮瓜甲細末和乳點之集簡方

目生珠管

手瓜甲燒灰貝齒燒灰龍骨各半兩為末日點三

四次聖惠方

赤目腫痛 自已小便乘熱淋洗即閉目少頃此以真氣退去

邪熱也普濟方

眼熱赤腫

人乳半合古銅錢十文銅器中磨令變色稀稠成

煎瓶收日點數次或以乳浸黃連蒸熱洗之

聖惠方

目赤生翳

初生孩兒胞衣曝乾焙研細末日日傳目皆中愈

乃止

千金

咽喉

咽喉乳蛾

土蜂窠一箇為末先用猪葉擦破病人舌令血出

以醋和末用翎點之令痰涎出為效後用竹根搗水服數口

取利

瑞竹堂方

咽中結塊不通水食危困欲死

百州霜蜜和丸芡子大每新

汲水化一丸灌下甚者不過二丸

名百靈丸

普濟方

喉痺乳蛾

烏龍尾枯礬猪牙皂莢以鹽炒黃等分為末或吹

或點皆妙

孫氏集方

喉痺腫痛

鉛白霜甘州半兩為末醋糊丸芡子大每含嚥一

丸立效

聖濟錄

喉痺腫痛

菖蒲根嚼汁燒秤錘淬一盃飲之

普濟方

舌腫咽痛咽生息肉舌腫

秤錘燒赤淬醋一盃含嚥之

聖惠方

喉痺及喉中執塞

車轄燒赤投酒中執飲

時珍

咽喉疼痛

銀朱海螵蛸末等分吹之取涎

急救方

纏喉風痺

雄黃磨新汲水一盞服取吐下愈

續千金方

咽喉腫痛五心煩執

不灰木以牛糞燒赤四兩太陰玄精石

煨赤四兩真珠一錢為末糯米粥凡芡子大每服一丸以生

地黃汁粟米泔研化服日二次

聖濟錄

喉痺腫痛

紫朱煮汁飲

普濟方

喉痺喉風

鴨背膽礬二錢半白僵蠶炒五錢研每以少許吹

之吐涎

濟生方

喉痺腫痛

石蟹磨水飲塗喉外

聖濟錄

喉中生肉

縣裏筋頭挂鹽揩之日五六度

孫真人方

喉痺腫痛

朴硝一兩細細含咽立效或加丹砂一錢

氣塞不通如生甘艸

風熱喉痺及纏喉風病 玉鑰匙焰硝一兩半白僵蠶一錢礪

砂半兩腦子一字為末吹之

三因方

咽喉穀賊腫痛 蓬砂牙砂等分為末蜜和半錢含燕

直指方

咽喉腫痛 蓬砂白梅等分搗丸艾子大每嚥化一九

經驗方

喉痺牙疳 盆砂末吹並擦之

集簡方

走馬喉痺 生白礬末塗于綿針上按于喉中立破綿針者用

榆條上以綿立作棗大也

儒門事親方

喉癰乳蛾 白礬三錢針鉋內溶化入劈開巴豆三粒煎乾去

豆研礬八喉立愈甚者以醋調灌之

濟生帳帶散法制烏龍赤各通開散膽白礬末

盛八猪膽中風乾研末每吹一錢八喉取涎出妙

咽喉穀賊腫痛 生礬石末少少點腫處吐涎以痒為度

聖惠方

風熱炭痛 白礬半斤研末化水新磚一片浸透取晒又浸又

晒至水乾八薰廁中浸一月取洗安陰處待霜出掃取每服

半錢水下 普濟方

懸癰垂長咽中煩悶、白礬燒灰鹽花等分為末筋頭頻點

在上去涎 孫用和秘室方

喉痺 皂莢綠礬八好米醋同研舍之嚥汁立瘥甚奇妙 傳信方

喉風腫痛 皂礬一斤米醋三斤拌晒乾末吹之痰涎出盡良

薑末少許八茶內漱口燕之即愈 孫氏集效方

肺熱喉痛有痰熱者 甘草炒二兩桔梗米泔浸一夜一兩每

服五錢水一鍾半八阿膠半片煎服 錢乙直訣

喉痺毒氣 桔梗二兩水三升煎一升頓服 千金方

喉痺作痛 遠志為末吹之涎出為度 直指方

發斑咽痛 玄參升麻甘艸各半兩水三盞煎一盞半溫服

南陽道人

書玄參升麻湯

急喉痺風不拘大人小兒 玄參鼠粘子半生半炒各一兩為

末新水服一盞立瘥

聖惠方

喉閉口噤 羌活三兩牛蒡子二兩水煎一鍾八白礬少許灌

之取效

聖濟錄

咽喉腫痛 土當歸切片含之立愈

時珍

喉痺作痛 升麻片含燕或以半兩煎服取吐

直指方

咽喉熱痛 龍膽搗水服之

集簡方

喉閉腫痛 艸藥金鎖匙即馬蹄艸以根搗并華水調下即效

救急方

冬月喉痺腫痛不可下藥者

蛇牀子燒烟於瓶口中含瓶嘴

吸烟其痰自出

聖惠方

熱擁咽痛

縮砂殼為末水服一錢

戴原禮方

喉痺口緊

地白根即馬蘭根或葉搗汁八米醋少許滴鼻孔

中或灌喉中取痰自開

孫一松試效方

咽喉腫痛

嫩艾搗汁細燕之

經方用青艾和荳葉一握同搗爛傳於喉上冬月取乾艾

亦得李巨所傳也

喉閉腫痛

益母草搗爛新汲水一盞絞濃汁頓飲隨吐愈冬

月用根

衛生易簡方

喉風喉痺

大青葉搗汁灌之取效止

衛生易簡方

喉痺腫痛

蠶寶一合升麻五分水一升煎三合入少蜜攪勻

細呷大驗

聖惠方用馬蘭子二升升麻一兩為末蜜丸服一錢

喉痺口緊

馬蘭花二兩蔓荊子一兩為末溫水服一錢

喉痺腫痛喘息欲死者 馬蘭根葉二兩水一升半煮一盞細

飲之立瘥 聖惠方用根搗汁三合蜜一合慢火熬成徐徐點

以制煎汁

咽隔不利疏風擁涎唾 牛蒡子微炒荊芥穗一兩炙甘草半

兩為末食後湯服二錢當緩緩取效

寇氏本草行義

懸癰喉痛風熱上搏也 惡實炒甘草生等分水煎含燕

名散普濟

喉痺腫痛 牛蒡子六分馬蘭子六分為散每空心溫水服方

寸七日再服仍以牛蒡子三兩鹽二兩研勻炒熟包慰喉外

廣濟

方

喉中熱腫 鼠粘艸根一升水五升煎一升分三服

延年方

纏喉風病 蒼耳根一把老薑一塊研汁入酒服

聖錄總錄

咽喉腫塞痰涎壅滯喉腫水不可下者 地菰一名鶴虱草連

根葉搗汁

傷寒○聖濟總錄用杜牛膝誠提草同

為炒○又方土牛膝春夏用莖秋冬用根一把青礬半兩同研

纏喉風腫

蚶蚶艸即鰓面艸細研以生蜜和凡彈子大每噙

一二丸即愈乾者

咽喉閉痛

蔡葉燈心艸燒灰等分吹之甚妙

集簡方

喉中似物吞吐不出腹脹羸瘦取白蘘荷根搗汁服鹽立出

也梅師方

喉舌瘡爛

酒漬蘘荷根半日含漱其汁瘡乃止

外臺秘要方聖惠

尸咽痛痺語聲不出

麻黃以青布裏燒烟筒中熏之

聖惠方

急喉痺塞

木賊以牛糞火燒存性每冷水服一錢血出即安

也聖惠方

急喉痺

燈心艸莖葉燒灰吹之甚捷

時珍

喉風痺塞

燈心瑞竹又一方用一握陰陽凡燒存性又炒鹽一匙每吹一

捻數次立

○惠濟方用燈心

紅花燒灰酒服一錢即消

喉痺乳蛾

新鮮牛膝根一握艾葉七片搗和人乳取汁灌入

鼻內須更痰涎從口鼻出即愈無艾亦可

一方牛膝搗汁灌

纏喉風痺不通欲死者

返魂艸根一莖洗淨納入喉中待取

惡涎出即瘥神效更以馬牙消津燕之即絕根本一名紫莖

咽喉生瘡脾肺虛熱上攻也

麥門冬一兩黃連半兩為末煉

蜜丸梧子大每服二十丸麥門冬湯下

普濟

喉痺腫痛

鴨跖艸

淡竹

汁點之

袖珍

熱欬咽痛

燈籠艸為末白湯服仍以醋調傳喉外

丹溪名清

喉瘡作痛

燈籠艸炒焦研末酒調呷之

醫學

喉痺乳蛾

豎簪衣鳳尾巾搗爛入霜梅肉煮酒各少許再研

絞汁以鷺翎刷患處隨手吐痰即消也

趙潛養
病漫筆

馬喉痺風躁腫連頰吐血數者馬鞭竹一握勿見風截去兩

頭搗汁飲之良

千金

喉痺不通

商陸薄切醋炒塗喉外良

喉卒攻痛

商陸切根炙熟隔布熨之冷則易立愈

圖經
本州

風毒咽腫燕水不下及瘰癧咽腫水服葭菰子末兩錢七神效

外臺

秘要

急喉痺塞牙關緊急不通用此即破以蓖麻子仁研爛紙卷

作筒燒烟熏及即通或只取油作搽尤妙

各聖
烟筒

咽中瘡腫

蓖麻子仁一枚朴硝一錢同研新汲水服之連進

二三服效

杜任又三因方用蓖麻仁
綿包齋燕之方金
前芥穗等分為末蜜丸

喉痺腫塞 附子去皮炮令折以蜜塗上炙之令蜜入含之勿

燕汁已成者即膿出未成者即消出

本艸拾遺

喉痺口噤不開欲死 艸烏頭皂莢等分為末入麝香少許擦

牙并嚙鼻內牙關自開也

濟生方用艸烏尖石膽等分為末每用一錢醋煮皂莢汁調稀掃入

腫上流涎數次其毒即破也

喉痺腫痛 白附子末枯礬等分研末塗舌上有涎吐出

聖惠方

喉風喉痺 天南星一箇剉心入白僵蠶七枚紙包煨熟研末

薑汁調服一錢甚者灌之吐涎愈

名如散博濟方

少陰咽痛生瘡不能言語聲不出者 半夏七枚打碎雞子一

枚頭開一竅去黃納苦酒令小滿入半夏在內以銀子坐于

炭火上煎三沸去滓置盃中時時燕之極驗未瘥更作

喉痺腫塞 生半夏嚙鼻內涎出效

集簡方

咽喉殼賊腫痛 重臺赤色者用大黃炒木鼈子仁馬牙消半

兩半夏泡一分為末蜜丸茨子大含之

聖惠方

咽喉腫痛 射干花根山豆根陰乾為末吹之如神

袖珍方

喉痺不通漿水不入 射干一片含燕汁大腑動即解或醋研

汁噙引涎出亦妙

外臺秘要又便民方用紫蝴蝶根一莖黃芩生

愈名棄命散

喉痺作痛 蠶木鼈青木香山豆根等分為吹之

楊拱鑿方摘要

纏喉風腫 蠶木鼈仁一箇木香三分同磨水調熊膽三分膽

礬五分以鷄毛掃患處取效

唐璠經方

喉痺腫痛 搥藤子燒研酒服一莖

聖惠方

口咽痛痒語聲不出 薔薇根皮射干一兩甘草炙半兩每服

二錢水煎服之

普濟方

咽喉腫痛語聲不出 枯樓皮白僵蠶炒甘艸炒各二錢半為

末每服三錢半薑湯下或以綿裹半錢含燕一日二服名發聖散經道方

咽痛喉痺 九仙子以新汲水或醋磨汁含燕甚良時珍

喉風急證牙關緊閉水穀不下 山豆根白礬等分水煎噙之

燕下二三日即愈楊清叟外科

咽喉腫痛水漿不下 苦藥山豆根甘艸硝石各一分射干柑

皮升麻各半兩為末蜜凡噙之聖惠方

喉中熱塞腫痛散血消痰 白礬朴硝等分為末吹之日四五

次直指方

咽喉腫痛 白藥末一兩龍腦一分蜜和九茱子大每含燕一

丸聖惠方

喉痺腫痛 五爪龍艸車前草馬蘭菊各一握搗汁徐燕醫學正傳

喉痺腫塞喘息不通須臾欲絕 絡石州一兩水一升煎一大

蓋細細呬之少頃即通

外聖要

喉痺乳蛾 金銀花俗名甜藤采花連莖葉自然汁半盞煎八

分服之以渣傳上敗毒托裏散氣和血其功獨勝

萬表積善堂方

喉痺不語 羊蹄獨根者勿見風日及婦人鷄犬以三年醋研

如泥生布拭喉外令赤塗之

千金方

懸癭舌腫咽生息肉 羊蹄州煮汁熱含冷則吐之

聖惠

喉痺腫痛 菖蒲根嚼汁燒鐵杆銕淬酒盃一飲之

聖濟總錄

咽喉腫痛燕物不得 馬勃一分蛇退皮一條燒末綿裹一處

含燕立瘥

聖惠方

走馬喉痺 馬屁勃即灰菰焰消一兩為末每吹一字吐涎血

即愈

經驗良方

穀賊尸咽喉中痛痒此因誤吞穀芒檜刺痒痛也谷賊屬咽尸

咽屬喉不可不分 脂麻炒研白湯調下

三四方

喉痺腫痛 生麻油一合灌之立愈

總錄

飲酒咽爛口舌生瘡 大麻仁一升黃芩二兩為末蜜丸含之

千金方

咽喉腫痛卒不下食 白麴和醋塗喉外腫處

善濟方

喉痺叱腮 前膏貼項下及腫處一夜便消乾即換之當令濕

為效

喉痺腫痛 稻艸燒取墨烟醋調吹鼻中或灌入喉中滾出痰

立愈

善濟方

走馬喉痺 粳穀奴燒研酒服方寸匕立效

時珍

喉卒癰腫 吞薏苡仁二枚良

外臺

喉痺不語

大豆黃汁稠如飴含之并飲汁

附后方

喉痺不語

煮豉汁一升服覆取汗仍着桂末于舌下燕之

千金

咽生瘰肉

鹽豉和搗塗之先刺破出乃用神效

聖濟總方

咽傷聲破

酒一合酥一匕乾薑末二匕和服日二次

十良方便方

喉腫難食

韭一把搗熬傳之冷即易

千金方

喉中腫塞氣不通者

葱鬚陰乾為末每用二錢入蒲州膽礬

末一錢和勻每用一字吹之

杜任方

咽喉腫痛

薤根醋搗傳腫處冷即易之

聖惠

狗咽氣塞喘息不通須臾欲絕

獨頭蒜二枚削去兩頭塞鼻

中左患塞左右患塞左候口膿血出立效

聖惠

喉痺腫痛

大蒜塞鼻耳中日二易之

附后方

喉痺腫痛 芥子末水和傳喉下乾即易之

又一方用辣芥子研末醋調取汁點

入喉內待喉內鳴却用陳麻骨燒烟吸入立愈
非聖惠方

喉痺腫痛 蘿蔔汁和皂莢漿服取吐
善濟方

喉毒毒氣 生薑二斤搗汁蜜五合煎勻每服一合日五服

喉痺腫痛 野苦蕒搗汁半盞燈心以湯浸捻汁半盞和勻服

普濟方

喉痺腫痛 糟茄或漿茄細嚼燕汁
德生堂方

咽喉腫痛 老黃瓜一枚去子入硝填滿陰乾為末每以少許

吹之
醫林集要

喉閉腫痛 天羅瓜研汁灌之
普濟

喉風腫痛 絲瓜根以瓦瓶盛水浸飲之
海上名方

咽喉痺痛 五月五日收桑上木耳白如魚鱗者臨時搗碎綿

包彈子大蜜湯浸含之立效
便民方

喉痺痰嗽

杏仁去皮熬黃三分和桂末一分研泥裹含之燕

汁

陳藏器

喉熱生瘡方同上

喉痺乳蛾

青梅二十枚鹽十二兩淹五日取梅汁八明礬三

兩桔梗白芷防風各二兩豬牙皂角三十條俱為細末拌汁

和梅入瓶收之每用一枚噙燕津液凡中風痰厥牙關不開

用此擦之尤佳

水梅

總錄用白梅包生礬末作丸含燕或納吞之

喉痺塞痛

桃皮煮汁三升服

千金翼

喉痺腫痛

荔枝花及皮根水煮汁細細含燕取瘡止

崔元亮海上方

尸咽痛痒語言不出

樞實半兩燕英一兩杏仁桂各半兩為

末蜜丸彈子大含燕

聖濟總錄

咽喉作痛

菜菔末醋調塗喉外一夕愈

集簡方

喉痺不語

桂着舌下燕汁

又方桂末三錢水二盞煎一盞服取汁千金方

咽喉閉痛 生烏藥即矮樟根以酸醋二盞煎一盞先窩後燕

吐痰惡為愈 經方

風熱喉痺 燈心一錢黃蘗五分並燒存性白礬七分煨過水

片腦三分為末每以一二分吹患處此陸一峯家傳絕妙方

也 頻湖集

咽喉熱痛 胡桐淚水磨掃之取涎 時珍

卒喉痺痛 黃蘗片含之又以一斤酒一斗煮二沸恣飲便愈

肘后方

咽喉卒腫食飲不通 苦酒和黃蘗末傅之冷即易 肘后方

喉痺欲絕不可針藥者 乾漆燒烟以筒吸之 聖濟總錄

急喉痺塞遂巡不救 皂莢生研末每以少許點患處外以醋

調厚封項下須臾便破出血即愈或按水灌之亦良 直指方用皂角

肉半截水醋半盞煎七分破出膿血即愈

咽喉腫痛

牙皂一挺去皮米醋浸炙七次勿令大焦為末每

以吹少許入咽吐涎即止

聖濟總錄

喉痺垂死止有餘氣者

巴豆去皮線穿內入喉中牽出即甦

千金

纏喉風痺

巴豆兩粒紙卷作角切斷兩頭以針牽孔內入喉

中氣透即通

勝金方

天絲八咽凡露地飲食有飛絲入上食之令人咽喉生瘡急

以白礬巴豆燒灰吹入即愈

瑣錄

咽喉不通牙關緊閉

以研爛巴豆綿紙包壓取油作搽點燈

次滅熏鼻中或用熱烟刺入喉中即時出涎

喉痺喉風

五月五日或月六六日七月七日采楮挑陰乾每

用一箇為末并華水服之重者以兩箇

集簡方

喉痺瘡腫

荆癭細細嚥之或以荆一握水煎服之

千金翼

戶咽痛痒声音不出

履鼻繩燒灰水服之

葛洪肘后方

喉痺痰厥

燈盞油鷲翎掃入喉內吐即效

咽喉痺塞

取漆筋燒烟含燕烟氣入腹發軟即破

咽中懸癰舌腫塞痛

五倍子末白薑吞末甘州末等分白梅

肉搗和丸彈子大禽燕其癰自破也

朱氏經驗方

乳蛾喉痺

天漿子即紅姑娘徐徐嚥燕

喉風喉痺

白僵蠶炒白礬半生半燒等分為末每以一錢用

自然汁薑汁調灌得吐頑痰立效小兒加薄荷生薑少許同

調一方用白梅肉和丸綿裹含之燕汁也

朱氏集驗用白僵蠶炒半兩生甘州

一錢為末薑汁調服涎出立愈○聖惠用白僵蠶三七枚乳香一分為末每以一錢燒烟入喉中涎出即愈

急喉風痺 白殭蠶天南星等分生研為末每服一字薑汁調

灌涎出即愈後以生薑灸過含王氏博濟○百一選方無天

纏喉風痰 蠶蛻紙燒存性煉蜜和丸如芡實大含化燕津集驗

喉痺乳蛾已死者復活 牆上壁錢七箇內要活蛛二枚搦作

一處以白礬七分一塊化開以壁錢惹礬燒存性出毒火為

末竹管吹之立時就好忌熱肉硬物

喉痺乳蛾等證 癩蝦蟆眉酥和草烏尖末猪牙皂角末等分

為丸小豆大每研一九點患處神效活人心統

喉痺卒腫不下食 地龍十四條搗塗喉外又以一條著鹽化

水八蜜少許服之聖惠方

喉痺塞口 韭地紅小蚯蚓數條醋搗取食之即吐痰血二三

枕神普濟 聖惠用地龍一條研爛以鷄子白攪和灌入即

喉痺腫塞 裹含燕立效 蝸牛綿裹水浸含燕須臾立通 又用蝸牛七枚白

喉痺腫痛 端午日午時取蛇蚰十餘條同鹽三四箇小瓶內

封固俟化成水取水含之 唐氏

喉塞口禁 蛇蚰炙二七枚白梅四炒二七枚白礬半生半燒

二爻研為末每水調半爻服得吐立通 聖惠方

纏喉風疾氣閉者 蛇蚰炙當歸等分為末溫酒服一錢取吐

桂枝方 梅一方用蛇皮揉辟燒筒吸入即破 一方蛇皮果白

乳蛾喉痺 青魚膽燕含 一方用牙灌鼻中取吐 萬氏用膽

取吐 一方用朴硝代膽礬

喉痺將死者 鱧魚點入少許即瘥病深者水調灌之 靈苑方

喉痺腫痛 黃頰魚燒研茶服三錢 珍時

喉痺 鮫魚和白礬灰為丸綿裹納喉中吐去惡涎即愈

喉痺 烏賊魚同白礬末吹鼻時珍

喉痺腫痛 蟹鹽汁滿含細細嚥即消時珍

口瘡塞咽 豬膏白蜜一斤黃連末一兩合煎取汁熬調每服

棗許日五服千金

喉痺已破瘡口痛 豬腦髓蒸熟入薑醋喫之即愈普濟方

喉風閉塞 臘月初一日取豬膽不拘大小五六枚用黃連青

黛薄荷僵蠶白礬朴硝各五錢裝入膽內青紙包了將地掘一

孔方深各一尺以竹橫懸此膽在內以物蓋定俟至立春日

取出待風吹去膽皮青紙研末蜜收每吹少許神驗乃萬金

不傳之方邵真人經驗方

喉痺腫塞欲死 牛角燒灰酒服一錢

喉閉乳蛾

鷄肫黃皮勿洗陰乾燒末用竹管吹之即破愈

青囊方

喉痺腫痛

鷄矢白含之燕汁

聖惠

咽塞鼻瘡及乾嘔頭痛食不下

鷄子一枚開一竅去黃留白

著米醋煨火頓沸取下更頓如此三次乘熱飲之不過一二

度即愈

普濟方

咽喉噤塞

雄雀屎末溫水灌半

外臺

喉痺乳蛾

白丁香二十個以沙糖和作三丸每以一丸綿裹

含燕即時遂愈甚者不過二丸極有奇效

普濟方

咽喉痺痛一切熱氣

鼯鼠研末含燕神效

時珍

帝鍾喉風垂長半寸

煨食鹽頻之即消

聖惠方

咽喉腫痛

蓬朮白梅等分搗丸茨子大每嚥化一丸

經驗方

喉痺牙疳

益砂末吹並擦之

席簡方

咽喉卒塞無藥處

以皂角末吹鼻取嚏仍以李樹近根皮磨

水塗喉外良驗

救急雜說

咽喉怪證咽喉生瘡層層如疊不痛日久有竅出臭氣糜飲食

用

臭橘葉煎湯服必愈

夏子益奇病方

卒然咽噎

炭末蜜丸含燕

并金

諸物
哽咽

魚骨哽咽

乳水一盃合口向水張口取水氣哽當自下肘后方

骨哽在咽

磁石水煨醋淬陳橘紅焙多年將漿水脚炒等分為

末別以漿水脚和九茈子大每含燕聖濟錄一九

咽喉骨哽

五月五日午時韭畦中面東勿語取蚯蚓泥取之

每用少許擦喉外其骨自消名六一泥

骨哽在咽

鵬砂一塊含化燕汁最妙

魚骨哽咽

白芍藥嚼細燕汁事林廣記

魚骨入咽

縮砂甘艸等分為末綿裹含之燕汁當隨痰出矣

王璆百一選方

咽喉骨哽

生艾蒿數升水酒共一斗煮四升細細飲之當下

外臺秘要

鷄魚骨哽

苧麻根搗汁以匙挑灌之立效時珍

諸骨哽咽

地菰馬鞭草各一握去根白梅肉一箇白礬一錢

搗作彈丸綿裹含燕其骨自軟而下

普濟方

咽喉骨哽

瞿麥為末水服方寸匕日二

外臺秘要

竹木骨硬

蓖麻子仁一兩麴水石二兩研勻每以一捻置舌

根禽燕自然不見

又方蓖麻油紅麴等分研細沙糖丸皂子

雞魚骨哽

蓖麻子仁

研爛八百藥煎丸彈子大井花水化

下半丸即下

骨哽在咽

半夏白芷等分為末水服方寸匕當嘔出忌羊

外臺秘要

咽喉骨哽

半夏白芷等分為末水服方寸匕當嘔出忌羊肉

外臺秘要

咽喉物哽

金鳳花根嚼爛禽燕骨下

雞骨丸効即以溫水

漱口免損齒也亦治誤吞銅鐵

危氏得効方

咽中骨哽欲死者 白鳳仙子研水一大呷以竹筒灌入喉其

物即軟不可經牙或為末吹之

普濟方

骨哽不出

薔薇根末水服方寸七日三

外臺秘要

諸物哽咽

白欬白芷等分為末水服二錢

聖惠方

鐵刺諸哽及竹木哽在咽中

白欬半夏泡等分為末酒服半

錢日二服

聖惠方

諸骨哽咽

白藥煎米醋細燕在上即吐出在下即下出

普濟方

諸骨哽咽

威靈仙一兩二錢砂仁一兩沙糖一盞水二鍾煎

一鍾溫服

乾坤生意用威靈仙米醋浸二日晒研末醋糊丸梧子大每服二三丸半茶半湯下如欲吐以銅青

末半匙入油一二點

威靈仙五錢并華水煎服自散如綿吞下也甚効

魚骨哽咽

馬勃末蜜丸彈子大喻燕

聖濟錄

魚骨哽咽不能出

飴糖丸鷄子黃大吞之不下再吞

附后

諸魚骨哽

薤白嚼柔以繩繫中吞到哽處引之即出方

魚骨哽咽

獨頭蒜塞鼻中自出良方

魚骨哽咽

百合五兩研末蜜水調團頸項包佳不過三五次

自下聖濟

咽喉骨鯁

七月七日取絲瓜根陰乾燒存性每服二錢以原

鯁物煮湯之筆峯雜興

箭鏑在咽或刀刃在咽隔諸隱處杵杏仁傳肘后方

骨鯁在咽 栗子內薄皮燒存性研末吹入咽中即下聖濟總錄用栗

子肉上皮半兩為末點魚肝一個乳香二錢半同搗九梧子大者鯁遠近以線繫綿裹一丸水潤吞之提綿鈎出也

魚骨鯁咽

橘皮常含咽汁即下聖濟方

骨在肉中不出者 咀茱萸封之骨當癢出孟詵食療

魚骨入腹刺痛不得出者 吳茱萸水煮一棗溫服其骨必軟

出未出再服

孟詵
產乳

魚骨哽咽

白膠香細細吞之

聖惠方

咽喉骨哽

乳香一錢水研服之

衛生月
節方

咽喉骨哽

猪牙皂角二條切碎生絹袋盛縫滿綿縛項中立

消簡便

魚骨哽咽

皂角末吹鼻取嚏

聖惠方

諸骨硬咽

紅椹子細嚼先燕汁后燕滓新水送下乾者亦可

聖惠方

魚骨硬咽

楮葉搗汁吸之

十便良方

魚骨硬咽

楮樹嫩皮搗爛為丸水下二三十丸

衛生易
簡方

猪鷄骨哽

五月五日取楮子晒乾白茯苓等分為末每服二

錢乳香湯下一方不用楮子以所哽骨煎湯下

經驗良方

魚骨哽咽六七日不出 琥珀珠一串推入哽所牽引之即出

外臺秘要

魚骨哽咽

籬脚朽竹去泥研末蜜丸荻子大綿裹含之其骨

自消也

王璵百選方

髮哽咽中

舊木梳燒灰酒服之

集玄方

魚骨哽者

以魚網覆頸或煮汁飲之當自下

藏又方燒灰水
器服或乳香湯

服甚者併進三服時

珍

諸魚骨鯁

以妍蜜稍稍服之令下

葛氏

鷄骨哽咽

五倍子末摻入喉中即化下

海上方

咽喉骨哽

桑螵蛸醋煎呷之

經驗方

咽喉骨哽

桑木上虫糞米醋煎呷

永類方

竹刺入肉

竈馬一枚搗傳

時珍

諸魚骨鯁

鯉魚脊三十六鱗焙研涼水服之其刺自跳出神

妙筆峯
雜興

骨鯁竹木刺在喉中

鯢魚膽以酒化二枚溫呷取吐

時珍

骨鯁竹木刺入咽喉

不拘大人小兒日久或入臟腑痛刺黃瘦

甚者服之皆出

臘月取鯢魚膽懸北簷下令乾每用一皂

子煎酒溫呷得吐則鯁隨涎出未吐再服以吐為度酒隨量

飲無不出者鯢魚鯽魚鯢魚膽皆可勝金

骨鯁在喉

栗子肉上皮半兩研末乳香鮎魚肝各一分同搗

丸梧子大以綿裹一丸吞下釣出

總錄

喉中物哽

生鯢魚線縛其頭以尾先入喉中牽拽出之

普濟方

骨硬在喉

烏賊魚骨陳橘紅焙等分為末寒食麴和飭丸炙

子大每用丸含化燕汁

聖濟總錄

諸骨硬

鴨肫衣炙研水服一錢即愈取消導也

時珍

魚哽及魚骨入肉不出痛甚者

水狗肉燒研飲服或煮汁飲

亦可

藏器

鷄骨哽咽

活鷄一隻打取出鷄內金洗淨燈州裹于火上燒

存性竹筒吹入咽內即消不可見肉

攝生方

骨哽

以鷄足一隻燒灰水服

時珍

咽喉骨哽

白雄雞左右大毛各一枚燒灰水服

外臺

咽喉骨哽

吞脂膏一團不瘥更吞之

千金

諸骨哽咽

狗涎頻滴骨上自下

仇遠
母婢史

桃李哽咽

狗骨煮湯摩頭上

子錄

咽喉骨哽

羊脰骨灰米飲服一錢

聖惠

數骨哽咽

虎骨為末水服方寸匕

外臺

諸獸骨鞭

象牙磨水吞之

方 永類

骨刺入肉

象牙刮末以水煮白梅肉調塗自軟

簡要 濟衆

咽喉骨哽

鹿角為末含之

燕津 斗門 方

竹木入肉不出者 鹿角燒末水和塗上立出久者不過一夕

千金 方

骨哽不下

狼屎燒灰水服之

時珍

蛇骨刺入痛甚

用死鼠燒傳

肘后

吞髮在咽 取自己亂髮燒灰水服一錢 延齡至

一、凡患此症者，服此藥一錢，即愈。此藥名曰：...

二、凡患此症者，服此藥一錢，即愈。此藥名曰：...

三、凡患此症者，服此藥一錢，即愈。此藥名曰：...

四、凡患此症者，服此藥一錢，即愈。此藥名曰：...

五、凡患此症者，服此藥一錢，即愈。此藥名曰：...

六、凡患此症者，服此藥一錢，即愈。此藥名曰：...

七、凡患此症者，服此藥一錢，即愈。此藥名曰：...

八、凡患此症者，服此藥一錢，即愈。此藥名曰：...

九、凡患此症者，服此藥一錢，即愈。此藥名曰：...

十、凡患此症者，服此藥一錢，即愈。此藥名曰：...

十一、凡患此症者，服此藥一錢，即愈。此藥名曰：...

十二、凡患此症者，服此藥一錢，即愈。此藥名曰：...



